

ච්චි පාලනය

මස් සඳහා ච්චිවන් ඇති කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලන කටයුතු අතීතයේ සිට මේ දක්වා කෘෂි ආර්ථික රටාවට අනුයුක්තව බැඳී පවතී. මෙහි දී, ගව පාලනය සඳහා සුවිශේෂී තැනක් හිමිවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින විවිධ ගැටළු සහගත තත්ත්ව යටතේ මස් පිණිස ගවයන් ඇති කිරීම සීමා වී තිබේ. ගව පාලනය සඳහා දියුණු ගව වර්ග බෝ කිරීම හා අවශ්‍ය තෘණ බිම් සකස් කිරීම සඳහා අනෙකුත් සතුන් සමඟ සසඳා බලන කල දීර්ඝ කාලයක් ගත වේ. මෙරට වැඩි වන ජනගහනයට අනුව, අවශ්‍ය මස් සඳහා පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීම පිණිස දැනට නිපදවන ගව මස් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

සෑම සත්ත්ව පාලන ව්‍යාපාරයකටම වඩා මසට එළවන ඇති කිරීමේ වියාල හැකියාවක් මෙරට පවතී. එමෙන්ම, එම මස් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ද ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. වෙනත් සත්ත්ව පාලන ව්‍යාපෘති හා සසඳා බලන විට මෙය ඉතා ලාභදායක වූවකි. ඊට අමතරව, මේ සඳහා විශේෂ වූ දැනුමක් හා වියාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ද අවශ්‍ය නොවේ.

ගෝග්‍රා ප්‍රදේශ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක එළු පාලනය සිදු කල හැකි වුවත්, ඒ සඳහා වඩා යෝග්‍ය වන්නේ වියළි කලාපය යි. විශේෂයෙන්, වෙනත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යොදා නොගත් පුත්තලම, මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව හා හම්බන්තොට වැනි ප්‍රදේශයන් හි මේ සඳහා ඉතාමත් හිතකර තත්ත්ව පවතී. මෙම ප්‍රදේශවල පවතින පදුරු සහිත ලදු කැලෑ බිම් මගින් එළවනට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය

ලබා ගත හැකිය. එළුවෙකුට අවශ්‍ය බිම් ප්‍රමාණය නිසැක වශයෙන්ම කිව නොහැකි වුවත් හොඳින් වැවෙන ශාක සහිත ග්ලිසිඩියා, ගම්පුරියා වැනි ගස් වර්ග වලින් වැටවුණු සමත්චිත අක්කරයක ඉඩම් ප්‍රමාණය එළවන් 05 දෙනෙකු පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ය.

බෝ කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ එළු පාලනය සඳහා සතුන් සොයා ගැනීම එතරම් අපහසු නොවේ. දේශීය එළවන්

සාගරිකා පසලුන් ඔහුගේ හිරිහාමු.

පර්යේෂණ ක්‍රියාමාර්ග

කෘෂි ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපෘති ඇගයීම් අංශය

හෙක්ටර් කොඩ්ඩැකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය

මගින් සපුරාලිය හැකි වුව ද, පට්ටි දැමීම සඳහා ඇති කරන පිරිමි සතුන් සඳහා සාන්ද්‍ර ආහාර යම් ප්‍රමාණයක් සැපයිය යුතුය. මේ සඳහා සහල් නිවුඩු හා පොල් පුත්තක්කු අවශ්‍ය පරිදි සමානව මිශ්‍ර කර බණ්ඨ මිශ්‍රනය ද අවුත්ස 01 ක් මිශ්‍ර කර දිනපතා ලබාදීම කල යුතුය.

නිවාස

ගව පාලනයේ දී හෝ කුකුළු පාලනයේ දී මෙන් ක්‍රමවත් නිවාස එළවන් සඳහා අවශ්‍ය නොවේ. ඉඩොරු යෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා සකස් කරන ලද සරල එළු මඩු මේ සඳහා සෑහේ. මෙම මඩු ලී අඩු උපයෝගී කරගෙන ඉතා අඩු වියදම

කින් සාදා ගත හැකිය. එළු කොටුවක් සෑදීමේ දී වඩා වැදගත් වන්නේ පොලවේ සිට අඩි 03 ක් ඉහලින් පිහිටන ලෙස පහසුවෙන් අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කල හැකි වන පරිදි එළු මඩුවේ මතුපිට සකස් කිරීම යි. එක් සතෙකු සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය වර්ග මීටර් 02 කි. බිම පිරිසිදු කල හැකි බැවුමකින් යුක්ත විය යුතුය. අයහපත් වාතාශ්‍රය හා සතුන් ගහනය වැඩිවීමේ හේතු - වෙන් සතුන්ට නියුමෝනියා රෝගය වැළඳිය හැකිය. එළවන් ඇති කිරීම පහසු කාර්යයක් වුව ද, මෙහි දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු තිබේ. උලා කෑම සඳහා ඇති තෘණ බිම් ප්‍රමාණය සීමාසහිත නිසා එළවන් හා ගවයන් එකට ඇති කිරීම බොහෝ ගොවියන් සිදු කරන වරදකි. මෙසේ සතුන් දෙවර්ගයම එකට උලා කෑමේ දී එළු පක්ෂගාත රෝගය වැළඳිය හැකිය. එළු පක්ෂගාත රෝගය ගවයන්ගේ පිරිණ පද්ධතියේ පිටින් වන පත්‍රවෙකු ගෙන් බෝවේ. ගව පිරිණ පද්ධතියේ සිටින පත්‍රවන් ගොම මගින් ගව ශරීරයෙන් පිටතට විත් තෘණ

සාමාන්‍ය කුඩා සිරුරකින් යුක්ත වුවත් එක් සතෙකුගෙන් මස් කි.ග්‍රෑ. 9-11 ක් අතර ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් ලබාගත හැකිය. දේශීය සතුන්, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හඳුන්වා දී ඇති බිකානාර්, මැඩරාස් රෙඩ් හා බෝයර් වැනි පුළුල් සිරුරකින් යුතු දියුණු වර්ග සමඟ දෙමුහුන් කිරීමෙන් වැඩි දියුණු කර ගත හැකි වේ. එළු දෙනුන් වසරකට දෙවරක් පැටවුන් බිහි කරන හෙයින් පැටවුන් බෝ කර ගැනීමට වැඩි කාලයක් ගත නොවේ. පට්ටි දැමීම සඳහා දෙනුන් 30 ක් සඳහා එක් එළුවකු සැහෙන අතර සතුන් පළමු වරට පට්ටියට දැමීම සඳහා අඩුම වශයෙන් අවුරුද්දක්වත් වයස සම්පූර්ණ විය යුතුය. දෙනෙකුගේ පට්ටි දැමීමේ ලක්ෂණ (මල) පහල විමේ චක්‍රය දින 17-21 අතර වේ.

ආහාර බෝදීම

මසට එළවන් ඇති කිරීමේ දී අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ආහාර ප්‍රමාණය උලා කෑමට ඉඩ හැරීම

මහින් රථවාගේ ශරීරයට ඇතුළු වේ. එසේ ඇතුළු වන පනුවත් රථවත්ගේ මොලයේ හා කොඳු තාරටියේ ජීවත් වේ. මෙම රෝගය වැළඳීමෙන් සතුන්ගේ ශරීරයේ එක් පැත්තක් පණ තැනී විම හෝ අප්‍රාණික විම සිදු වේ. මේ සඳහා ප්‍රතිකාරයක් නොමැති අතර කලයුත්තේ රථවත් හා ගවයන් එකට පාලනය නොකිරීම යි.

ගෙත් කාලයේ රැක බලා ගැනීම

වියලි හා අරධ වියලි තත්ත්ව යටතේ රථවත් පහසුවෙන් ඇතිකළ හැකි වුවත්, තෙත් කාලගුණයේ දී සතුන් ප්‍රධාන රෝග දෙකකට ගොදුරු වේ.

- (i) ගැස්ට්‍රො' එන්ටෙරිටිස් තෙමටොඩි (පනුවන්) මහින්
- (ii) පාද කුණුවීම (බැක්ටීරියා) මහින්

ගැස්ට්‍රො'එන්ටෙරිටිස්

වැඩුණු සතුන් හා විශේෂයෙන් එර පැටවුන් මේ රෝග වලට ගොදුරු වේ. කුඩා සතුන් මවු සතුන් සමඟ තණකොළ උලා කෑමට යෑමෙන් මේ උවදුරට ගොදුරු වීම සිදු වේ. සතුන් මෙම උවදුරින් වළක්වා ගැනීම සඳහා පැටවුන් ඉපදී පළමුවන සතියේ හා නැවත මසකට පසු පත්‍ර බෙහෙත් ලබා දිය යුතු වේ. තිර්දේශිත පත්‍ර බෙහෙත්, වට පනුවන් මරධනය කිරීම සඳහා නිලවර්ම හා තයොබෙන්ඩසෝල්, පටි පනුවන් මරධනය සඳහා මැන්සන්ල් ය.

පාද කුණුවීම

වියලි කාලයේ දී, වියලි හා තද බවකින් යුතුව තිබී තෙත් කාලගුණයේ දී මෘදු බවකට පත්වන කුර තුළින් බැක්ටීරියා ශරීර ගත වීම මගින් පාද කුණු වීමේ රෝගයට එළවත් භාජනය වේ. මෙය සතුන්ට ඉතා වේදනාකාරී රෝගයකි. මධ්‍ය සහිත ප්‍රදේශ වල මෙය සිසුයෙන් පැතිරේ. රෝගය වැළැක්වීම සඳහා සතුන් කොටු තුලට ඇතුළු වීමේ දී 10% බ්ලූස්ටොන් (කොපර් සල්ෆේට්)

ද්‍රාවණයකින් පාද සේදීමට සැලැස්විය යුතුය.

කිතිතුල්ලන් පාලනය කිරීම ඇසන්ටොල්හාවිතයෙන් සිදු කළ හැකිය. මැක්කන් පාලනය කිරීමේ දී නිතර පරීක්ෂා කර නෙගුවොන් වලින් ප්‍රතිකාර කළ හැකිය.

කිරි සඳහා එළවත් ඇති කිරීම

කිරි සඳහා ගවයන් ඇති කිරීම හා සසඳා බැලීමේ දී, කිරි සඳහා එළවත් ඇති කිරීමේ විශේෂ වාසි කිහිපයක් පවතී. එනම් සුළු මුදලක් අවශ්‍ය වීම, අඩු ආහාර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීම, (එළ දෙනෙකුට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණයෙන් එළවත් 07 දෙනෙකු ඇති කළ හැකිය.) සතුන් ඉතා ඉක්මනින් බෝ වීම, සතුන්ගේ ජීවිත කාලය දීර්ඝ වීම යනාදිය යි. ඉහත සඳහන් විශේෂ වාසි පැවතිය ද, කිරිට එළවත් ඇති කිරීමේ විශේෂ ප්‍රවණතාවයක් මේ දක්වා ඇති වී නොමැත. එයට හේතු වන්නේ එර පාලනයේ පුරුද්දක් නොමැති නම, කිරි සඳහා

වියලි කාලයේ දී, වියලි හා තද බවකින් යුතුව තිබී තෙත් කාලගුණයේ දී මෘදු බවකට පත්වන කුර තුළින් බැක්ටීරියා ශරීර ගත වීම මගින් පාද කුණු වීමේ රෝගයට එළවත් භාජනය වේ.

එර පාලනය කිරීමේ විශේෂ සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම හා එර කිරි පානය කිරීමේ විශේෂ රුචියක් නොදැක්වීම යි. එර කිරි මේද ප්‍රතිශතය හා සසඳා බැලීමේ දී, මවුකිරි හා සමානය. එරකිරි ජනප්‍රිය ක්ෂණික ආහාරයක් ලෙස බොහෝ ආසියාතික රටවල මෙන්ම ග්‍රීසිය, ස්විස්ටර්ලන්තය වැනි රටවල ද ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. ස්විස්ටර්ලන්තයේ එරවා, දෙරුවා ගේ කිරි මව් ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ. එර කිරි ඖෂධීය ගුණයෙන් ද ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන්නවුන්

සඳහා ද එර කිරි තිර්දේශ කෙරේ. ඊට අමතරව රෝග සඳහා ප්‍රතිශක්ති බලයක් ද එර කිරිවල පවතී. මී කිරි වලට සමානව මුදවනු කිරි එර කිරි වලින් ලබා ගත හැකි ය.

දේශීය වර්ගයේ සතුන් ගෙන් දිනකට කිරි බෝතල් 1/2 සිට 1 දක්වා ලබා ගැනීමට පුළුවන. කෙසේ වුව ද නුමුහුන් ජමිනාපාරි හා සනෙන්ස් වර්ග සමඟ දේශීය සතුන් මුහුන් කිරීමෙන් ලැබෙන සතුන් දිනකට කිරි බෝතල් 3 ක් පමණ ලබා දේ. මනා පාලන තත්ත්ව යටතේ කිරි මුරයක් මාස 9-10 දක්වා කාලයක් පවත්වා ගත හැකිය. කිරි සඳහා එළවත් ඇති කිරීමේ දී සතුන් බෝ කිරීම ඉතා වැදගත් පියවරකි. එළවත් ඉතා ඉක්මනින් වැඩෙන නමුත් පට්ටියට යැවීමේ දී වැස්සියන් අඩුම වශයෙන් මාස 15 ක් ද, වස්සන් අවුරුද්දක් පමණවත් වයස් ගත විය යුතුය. ඊට අඩු වයසේ බිහිවන පැටවුන් ගෙන් ඇති වන වැස්සියන්ගෙන් ලැබෙන කිරි ප්‍රමාණය අඩුය. එබැවින්, නියම වයසට පත් වන තෙක් වස්සන් හා වැස්සියන් වෙන් කර ඇති කළ යුතුය. එළවෙකුගේ ගැබ් කාලය මාස 05 ක් පමණ වේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට දෙවරක් පැටවු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙරට අයහපත් ආහාර තත්ත්ව නිසා කිරි සඳහා ඇති කරන සතුන්ගෙන් අවුරුද්දකට දෙවරක් පැටවු ලබා නොගත යුතුය. අවුරුද්දකට පැටවු දෙවරක් ලබා ගතහොත් දෙනගේ කිරි මුරය, ගැබ් කාලය මැද හරියේ දී නතර වේ. ඊට අමතරව ලැබෙන පැටවු සෞඛ්‍ය හා වැඩිම අතින් දුරවල වේ.

හොඳ නිෂ්පාදනයක් උදෙසා එර දෙනුන් මිල දී ගැනීමේ දී කරුණු කිහිපයක් සැලකිය යුතුය. හොඳ එර දෙනක් නිරෝගී හා එඩිතර විය යුතුය. ඇගේ පාද සෘජුව තිබිය යුතු අතර පමණට වඩා කුර නොවැඩී තිබිය යුතුය. ලොම් මෘදු සියුම් බවකින් යුක්ත විය යුතුය. සිරුරෙන් පිටතට එල්ලා හැලෙන ලොම් සහිත සතුන් නුසුදුසු වන අතර ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය අඩුය. නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි සතුන්ගේ කිරි බුරුල්ල පැතිරී ගිය විශාල එකක් විය යුතුය.