

# එළඳෙන රැක බලා ගැනීම

අ.පො.ස. උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව විෂය හදාරණ පාඨක මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු කරමින් එම විෂය නිර්දේශය අලලා සැකසුනු ලිපි පෙළක පළවූවැන්නයි මේ. ඒ වෙනුවෙන් වෙන්වූ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාදීම පිණිස ඡේදමය ස්වරූපයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. මෙම ලිපිය මගින් 'ගව පාලනය' ඒකකය යටතේ එන ප්‍රසූතියට ආසන්න එළඳෙන රැක බලා ගැනීමේ සිට පැවරී පාලනය දක්වා කරුණු සාකච්ඡා කෙරේ.

ප්‍රසූතියට ආසන්න එළඳෙන රැක බලා ගැනීම :

සාමාන්‍යයෙන් එළඳෙනකගේ ගැබ් කාලය දින 280 කි. මින් ප්‍රසූතියට ආසන්න දින 60 ක පමණ කාලය ගව දෙනගේ

මීට අමතරව අවශ්‍ය පමණ බිමට ජලය හා ලවණ මිශ්‍රණයක් සැපයීමත් ඉතා වැදගත්ය. නවීන මතය අනුව අවසාන දින 14 දී ආහාර සලාකයේ කැල්සියම් අඩු කිරීමෙන් හා ප්‍රසූතියෙන් පසු කැල්සියම් වැඩිකිරීමෙන් උසස් නිෂ්පාදනයක් ඇති කිරීමට වැදගත් කිරී උණ රෝගය වලක්වා ගත හැක. (අඩු කිරී නිෂ්පාදනයක් ඇති දෙනුන්ට මෙය අදාළ නැත.)

තවද පෝෂණ මට්ටම ප්‍රමාණවත්දැයි මැන ගත හැකි ක්‍රමයක් ඇත. එනම් ශරීරයේ බාහිර ලක්ෂණ අනුව තෙරා ඇති ඇටවල පෙනුම අනුව, 1-5 දක්වා ලකුණු ක්‍රමයකින් අදාළ පෝෂණ මට්ටම සොයා ගත හැකි වේ. මේ සඳහා ඉල ඇට, කොළ ඇට, ලම්භා ඇට හා වලිගය මුල, සමේ රවුම් ගතිය නොහොත් මාංශ පේශීන්ගේ වැඩිම උපයෝගී කර ගත හැක.

**සාමාන්‍යයෙන් එළඳෙනකගේ ගැබ් කාලය දින 280 කි මින් ප්‍රසූතියට ආසන්න දින 60 ක පමණ කාලය ගව දෙනගේ කායික තත්ත්වයේ විශේෂ අවස්ථාවක් වේ**

කායික තත්ත්වයේ විශේෂ අවස්ථාවක් වේ. මෙම කාල සීමාවේදී කලලයේ බර 50% කින් පමණ වැඩි වන අතර, ශරීරය හා කිරි බුරුල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ලබන කිරි මුරය සඳහා මනාව පදම් කර ගත යුතු වේ. මෙම කායික අවශ්‍යතා සපුරා ලීම සඳහා දෙන පහත අයුරින් රැක බලා ගත යුතුයි.

පෝෂණ මට්ටම වැඩි කිරීම

මේ කාලයේදී ගවදෙනගේ ආගන්තුක ස්වාභාවිකව වැඩි වේ. සම්පූර්ණ දිරවිය හැකි ආහාර ප්‍රමාණය (වි.සී.එන්.) 66% ක් හා දල ප්‍රෝටීන (සී.පී.) 12% ක් සහිත සංඝටකයන්ගෙන් යුත් ආහාර සලාකයක් මේ අවධියේ ලැබිය යුතුය. එනමුත් අවසාන සති 2 කුල ආගන්තුක ක්‍රමානුකූලව අඩු වේ. එම කාලයේදී කෙඳි ගතිය අඩු පෝෂණ ද්‍රව්‍ය බෙහෙවින් අවශ්‍ය වේ. මෙසේ අත්‍යාවශ්‍ය සංඝටක වලින් තොර ආහාර සලාකයක් නොලද හොත් කලලයේ වැඩීම මෙන්ම එළ ගවයාගේ ශරීර වර්ධනය හීන වේ. එමගින් ලබන කිරි මුරයේ නිෂ්පාදනයද පහල බසී.

ලකුණු 1-1.8 - කෙටිවු භාවය හෝ මන්ද පෝෂණය  
4-5 - මහත බව නැතහොත් අධි පෝෂණය.

මෙසේ මැනගත් විට ගැබ් කාලයේ අවසානයේදී ශරීරයේ තත්ත්වය ලකුණු 3 සිට 3.5 දක්වා වේ නම්, එල ගවයාට ලැබී ඇති ආහාර සලාකය ක්‍රමවත් බව පැහැදිලි වේ.

**ප්‍රසූතියෙන් පසු කැල්සියම් වැඩිකිරීමෙන් උසස් නිෂ්පාදනයක් ඇති කිරීමට ගවයන්ට වැදගත් කිරී උණ රෝගය වලක්වා ගත හැක.**

කි.ග්‍රෑම් 300 බර ගවයෙකු සඳහා යෝජිත ආහාර සලාකයන් :

1. උසස් වර්ගයේ කෘණ කි.ග්‍රෑ. 45-60
2. රකිල කොල වර්ග කි.ග්‍රෑ. 5-10

3. සාන්ද්‍ර ආහාර

|                  |             |
|------------------|-------------|
| පොල් පුත්තක්කු   | කි.ග්‍රෑ. 1 |
| සහල් නිවුඩු      | කි.ග්‍රෑ. 1 |
| මොලැසස් (කර උක්) |             |
| (ක්ෂුපාක)        | ග්‍රෑම් 200 |
| ලවණ මිශ්‍රණය     | ග්‍රෑම් 60  |

කල පුත්තක්කු, හාල් කැඳ, ධාන්‍ය පොතු ආදියද යොදා ගැනීමෙන් වැඩි කිරී ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකිය.

සොබා රැක ගැනීම

ප්‍රසූතියට ආසන්න එළඳෙනව කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව සැකැස්මට වැදගත් වේ. කෘණ උලා කැම සඳහා කළ, කම්බි වැටවල්, කානු ආදිය සහිත ප්‍රදේශ වලට නොයැවීමෙන් හා කෘණ කපා ආහාරයට දීමෙන් දෙන වැටීමෙන් හෝ සිරීමෙන් අපහසුතාවයකට පත්වීම වලක්වා ගත හැක.

ගව රක්තපාතය, රිත්තිපෙස්ට්, කුර හා මුඛ රෝගය වැනි බෝවන රෝග හා පත්‍ර රෝග වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඇයට ප්‍රතිශක්තිකරණය හා බෙහෙත් වර්ග ප්‍රථමයෙන් ලබා දී තිබිය යුතුය. දේශගුණික වෙනස්වීම් නිසා ඇතිවන කිහිපුල්ලන් බෝවීම, නිව්මෝනියාව වැනි තත්ත්ව වැලැක්වීමටත්, පිරිසිදුකම පවත්වා ගැනීමටත් ආවරණ සහිත ගාලක බැඳිය යුතුය. නැවීම හා ශරීරය පිරිමැදීම වැනි සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු ද ක්‍රමානුකූලව සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ. ප්‍රසූතිය ආසන්න වූ විට විවේකීව සිටීමට හැරීම අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර, මේ සඳහා අලුත් පිදුරු වලින් යුත් ප්‍රසූත කොටුවක් හෝ වියළි කෘණ බිමක් ඉතාමත් යෝග්‍ය වේ.

ප්‍රසූතියට ආසන්න දෙන :

ප්‍රසූතියට ආසන්න වන විට දෙනගේ වලිග මුල හා ශ්‍රෝණි පෙදෙසේ අස්ථි බන්ධන මෘදු වී ලිහිල් තත්ත්වයක පවතී.

සතියකට දෙකකට පමණ පෙර සිට විශාල වීම ආරම්භ වූ බුරුල්ල එහි උපරිමය තෙක් විශාල වේ. යෝනිය ඉදිමී ඉන් ශ්ලේෂමල ස්‍රාවය වේ. ශරීර උෂ්ණත්වය ද මදක් පහල බසී. දෙන මහත් අපහසුතාවයකින් පෙළෙන බවක් දක්නට ලැබේ.

#### ප්‍රසූතිය :

ප්‍රසූතිය ඇරඹෙන්නේ ගර්භාෂය සංකෝචනය වීමත් සමගයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කලලය ශ්‍රීවය තුලින් පිටතට ඒ. පළමුව කලල පටලද (වතුර කෝෂය) ඉන් අනතුරුව

ශ්වසනය උත්තේජනය කල හැක. ද්විතීක අසාදන ඇතිවීම වැලැක්වීම සඳහා පෙකති වැල බිඳී ගිය ස්ථානය මත කොහොඹ තෙල් හෝ අයඩින් ආලේප කිරීම සුදුසුය. මීට අමතරව පැටවා පාරිසරික අපහසුතාවලට ලක් වීමට ඉඩ නොදිය යුතු අතරම දෙන පිළිබඳව ද සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ප්‍රසූතියෙන් පසු ගර්භාෂය සංකෝචනය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒ ආශ්‍රිත කලල පටල (වැදෑමක) පිටවේ. මේ සඳහා දින කීපයක් වුවද ගත වේ. නමුත් ගර්භාෂය විවිධ අසාදන වලට ලක් විය හැකි බැවින් මෙසේ පිටවන ස්‍රාවයන් අධික දුගඳකින් යුක්තදැයි සුපරීක්ෂාකාරී විය

කරයි. මේ නිසා අළුත් පැටවාට හැකි ඉක්මණින් මුල් කිරී ලබා දීමට ගව පාලකයා උනන්දු විය යුතුය.

මුල් දින කීපය තුල දෙන සමඟ පැටවාට සිටීමට සැලැස්වීමෙන් මේ අවශ්‍යතාව ඉටු වුවත් මුල්කිරී ඉරිම පරික්ෂාවට ලක් විය යුතුය. දෙනට අපහසු අවස්ථාවකදී හෝ නැවත කිරී උරා නො බොන විට දී මුල් කිරී දොවා බෝකලයකට දමා සුළුපුවක් ආධාරයෙන් හෝ ආමාශ තලයක් මාර්ගයෙන් පෙවිය යුතුය. මුල් කිරී දොවා පෙවීමට කරම් නුසුදුසු අවස්ථාවලදී (දෙනගේ බුරුල්ල අසාදන වලට ලක් වී ඇති විට) කෘතිම මුල්කිරී සකසා දිය යුතු අතරම කිරී දොවා බුරුල්ල සැහැල්ලු කල යුතුය. නමුත් වැඩි මුල්කිරී දොවා සැකසුම් ලෙස ඇසිරීමෙන් එය කල් කබා ගැනීමට හැක. එම මුල් කිරී කෘත්‍රිම මුල් කිරී වලට වඩා යෝග්‍ය වේ.

**ප්‍රසූතියෙන් පසු මුල් දින 3-4 තුල දෙනගෙන් ස්‍රාවය වන කිරී මුල් කිරී හෙවත් කොලෙස්ට්‍රම් ලෙස හඳුන්වයි.**

ඉදිරි ගාත්වල තුර හා පැටවාගේ නාසය ද දර්ශනය වේ. මේ අවස්ථාවේදී පාලකයා දෙනට උපකාර වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් පළමුව තම දෑත් හා දෙනගේ යෝනිය පෙදෙස පිරිසිදු කල යුතුය. ඉන්පසුව විෂබීජ නාශනය කරන ලද ලණු පටකින් හෝ දෑතින් ඉදිරි ගාත් පිටතට ඇදීම ප්‍රසූතිය සඳහා දරණ සංකෝචනවලට අනුකූලව ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කල යුතුය. මෙම ප්‍රසූති ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණවීම සඳහා පැයක් පමණ ගත වන අතර පැටවා අසාමාන්‍ය ලෙස පිහිටි විටදී හා වෙනත් අස්වාභාවික තත්ත්ව වලදී ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇත. එක් ගාතයක් පමණක් හෝ පසු ගාත් හෝ වලිගය පිටතට එනවිට හා හිස වෙනතකට යොමු වී ඉදිරි ගාත් පමණක් පිටතට එනවිට මෙසේ ප්‍රසූතිය අපහසු විය හැකිය. එබඳු අවස්ථාවලදී පැය 12 ක කාලසීමාවක් ගත වී ඇතිනම් හැකි ඉක්මණින් පඟු වෛද්‍ය සේවය ලබා ගත යුතුය.

යුතුය. එසේම පඟු වෛද්‍ය උපදෙස් ද ලබා ගත යුතුය. පැටවාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මෙන්ම පෝෂණ තත්ත්වය කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන ගව පාලකයා හැකි ඉක්මණින් පැටවාට 'මුල්කිරී' උරාබීමට සැලැස්වීමට ද වග බලා ගත යුතුය.

#### මුල්කිරී

ප්‍රසූතියෙන් පසු මුල් දින 3-4 තුල දෙනගෙන් ස්‍රාවය වන කිරී මුල් කිරී හෙවත් කොලෙස්ට්‍රම් ලෙස හඳුන්වයි. ලා කහ පැහැති කරමක් උතු දියරයක් වන මෙහි සංයුතිය සාමාන්‍ය කිරීවලට වඩා වෙනස්ය ප්‍රෝටීන්, ගැමා ග්ලොබුලින්, බහිර හා මේද වැඩි ප්‍රමාණ වලින් ද අඩු ජල ප්‍රමාණයක් ද අඩංගු වේ. එබැවින් පෝෂණීය ගුණය අතින් ඉහලය. ඉපදීමෙන් පැය 6 ක් ගතවීමට පෙර මුල් කිරී උරාබීම සිදු විය යුතුයි. ඉපදී පැය 6-10 පමණ කාලයදී මෙම

#### පැටව් පාලනය

මනා ලෙස පැටවුන් පාලනය නොකිරීමෙන් ගව පාලනයට විවිධ ගැටළුවලට මුහුණ පෑමට සිදු වේ. සතුන් රෝග වලට ප්‍රාථමික, වර්ධන වේගය අඩු වීමත්, සර්වකාර්ය අඩුවීම හෝ නැති වීමත් ප්‍රජනන අවධියට ඒමට වැඩි කලක් ගත වීමත් නිසා රංචුවෙන් ලබා ගත හැකි ආදායම අඩු වේ. මේ නිසා තම ගව රංචුවෙන් උපරිම වාසි අත්කර ගැනීමට ගව පාලකයා විසින් ගව පැටව් පාලනය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

පැටව් අවධියේදී සිදු කල යුතු විශේෂ කාර්ය කීපයකි.

1. බර මැනීම  
පැටවුන් ඉපදුන දින මවුන්ගේ බර මැනීම හා වැඩෙන කාලයේදී මාසයක් පාසා

#### පැටවාට සාක්ෂ කිරීම

මව විසින් අසුන උපන් පැටවා ලෙව කැමෙන් පිරිසිදු කරයි. එසේ නොමැති විටදී පාලකයා විසින් පැටවා පිරිසිදු කල යුතුය. ප්‍රසූතියේදී පැටවා හා මව අතර පෙකතිවැල සබඳතාවය බිඳී යාමෙන් මව සමඟ වූ ශ්වසන හුවමාරුව නැති වී යයි. මේ නිසා බාහිර වායුගෝලීය වාතය හොඳින් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි තාස්සවු හා මුඛය පිරිසිදු කල යුතුය. මේ වන විටත් පැටවා ශ්වසනය ආරම්භ කර නැතිනම් නාසයට පිඹීමෙන් හෝ කෙත්දකින් ස්පර්ශ කිරීමෙන්

**මුල් කිරී බීමෙන් අනතුරුව සාමාන්‍ය කිරී උරාබීමට හුරු වන පැටවාට දිගටම කිරී බීමට ඉඩ දීම ආර්ථිකමය නොවේ.**

ද්‍රව්‍ය ආන්ත්‍රික බිත්ති හරහා කෙලින්ම අවශෝෂණය වන අතර පැටවාට වැලැදීමට ඉඩ ඇති බොහෝ රෝග වලට එරෙහි ප්‍රතිශක්තිය ලබා දේ. ඊට අමතරව මුල් කිරීවල ඇති සමහර ද්‍රව්‍ය විරේකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් ආන්ත්‍රික මාර්ගය උත්තේජනය

මවුන්ගේ බර මැනීම වැදගත් වේ. පසුවේ වට රවුම ලණුවක මාර්ගයෙන් අහල් වලින් මැනීමෙන් හා එම අහල් ගණන බර අනුව සකසා ගත් සටහනක් සමඟ සසඳා බැලීමෙන් කරාදි නොමැතිව සතාගේ බර සහ වැඩීම නිරීක්ෂණය කර ගත හැක.

**2. හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රම භාවිතය**

පැවැත් වෙත් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරනු ලබයි.

අ. කන් සලකුණු - අංකයක් හෝ අකුරක් හෝ වෙනත් සංකේතයක් සහිත ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් කැබ්ලි කන්පෙති වල එල්වනු ලැබේ.  
සමහර අවස්ථාවලදී විශේෂ සින්ක වර්ගයක් භාවිතයෙන් කන්වල ඇතුළු පැත්තේ සලකුණු කරනු ලබයි.

ආ. සතුන්ගේ ජායාරූප තබා ගැනීම.

ඇ. කන් කැපීම - V හැඩැති සලකුණු යෙදීම.

ඈ. ගෙල පට්ටිල සලකුණු පැළඳවීම.

ඉ. හංවු ගැනීම - රත් කරන ලද යකඩ හෝ ද්‍රව නයිට්‍රජන් භාවිතා කර විශේෂිත අකුරු සලකුණු කරනු ලැබේ. නමුත් සමේ චරිතාකම අඩුවිය හැකි බැවින් පිටුපස පාදයේ දත හිසෙන් පහත කොටසේ හමු වෙසේ නිවරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ. හමු නිවරණය සඳහා පැවරාගේ වයස මාස අටකට වැඩිවිය යුතුය.

**3. අං සිදීම**

අනාගතයේදී ඇති විය හැකි උවදුරු හා අපහසුතා මැඩලීම අං සිදීමේ අරමුණ වේ. මේ සඳහා ද විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනු ලබයි.

අ. ගිනියම් යකඩයක් භාවිතා කිරීම.  
පැවරා ඉපදී සති 2-3 කට පසුව මෙය සිදු කරයි. පළමුව අත ප්‍රදේශයේ ලෝම කපා අත මතුපිට ගිනියම් යකඩය තත්පර 10-15 ක් පමණ තබයි. මෙය වරින් වර සිදු කර අත වර්ධනය වීම නිශේධනය කරයි. මීට අමතරව රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හා රබර් මුදු පැළඳවීම මගින් අං සිදීම සිදු කරයි.

**4. පෝෂණය**

මුල් කිරී බීමෙන් අනතුරුව සාමාන්‍ය

කිරි උරාබීමට හුරු වන පැවරාට දිගටම කිරි බීමට ඉඩ දීම ආරම්භකමය නොවේ. එමෙන්ම අනාගතයේදී ප්‍රධාන ආහාරය වන දල ආහාර ගැනීම කෙරෙහි හැකි ඉක්මනින් පැවරා පුරුදු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. මේ නිසා පැවරාට වයස දින 14 ක් පමණ වන විට සාන්ද්‍ර ආහාර දීම ආරම්භ කළ හැක. ගවයා රෝමාන්සිකයෙක් වුවද මාස 4 ක්

**මුල් කිරි ලැබීමෙන් පසු පැවරාට මවුකිරි වෙනුවට අඩු මිලට සාදා ගත් පිටිකිරි වර්ග දිය හැකිය.**

පමණ වන තුරු රුමනය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ නොවේ. ඒ සමග රුමනයේ වර්ධනය හා ක්‍රියාකාරීත්වය උත්තේජනය වීමටත්, රුමන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය වීමටත්, තත්කලීය ආහාර ලබා දීම වැදගත්ය. මේ සඳහා ක්‍රමයෙන් පැවරා දල ආහාර වලට ද පුරුදු කළ යුතුය. අනතුරුව උලා කෑම සඳහා තෘණ පිට්ටිලට යැවීමට හැකි වේ. ක්‍රමයෙන් සාන්ද්‍ර ආහාර හා දල ආහාර වලට හුරුවන පැවරා ඉක්මනින්ම කිරි වැරීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත් වේ.

**5. කිරි වැරීම**

ඉපදීමෙන් පසු දිනකට පැවරාගේ දේහ බරින් 10% ක කිරි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. මේ අනුව කිරි ලැබෙන විට පැවරාගේ වර්ධනය ක්‍රමානුකූල වේ. මුල් කිරි ලැබීමෙන් පසු පැවරාට මවුකිරි වෙනුවට අඩු මිලට සාදා ගත් පිටිකිරි වර්ග දිය හැකිය. ඒ සමගම ඉපදී දින 14 සිට සාන්ද්‍ර ආහාර, කලන ලද බඩ ඉරිඟු නැතහොත් බකල වැනි අල වර්ග ද, වියළි තෘණ පුරුදු කිරීමෙන්, ඉපදී සති 4 දී කිරි වැරීම කළ හැක. ඉපදුන දින සිට, දිනකට ග්‍රෑම් 400-600 ක හෝ 1000 ක බර වැඩිවීමක් ඇති වීම ඉක්මනින් කිරි වැරීමේ පරමාර්ථය වේ. (ගවයින්ගේ වර්ෂ අනුව) පැවරුන්ගේ කිරි ඉරීම හා මව් දෙනගේ දර්ශන පරාසට හමුවීම සීමාකිරීමෙන් මව් දෙන ඉක්මනින් නැවත ගැබ් කර ගැනීමට හැකි වේ.

**6. එන්නත් කිරීම හා පණු බෙහෙත් දීම**

පහත සඳහන් ආකාරයට වසු පැවරුන්ට එන්නත් හා පණු බෙහෙත් ලබා දිය යුතුය. පළමු සතිය තුළ -

කම්බැන්ට්‍රින්, ඇල්බෙන්ඩසෝල් හෝ නිල්වර්මී වැනි පණු බෙහෙත් වර්ගයක් ජීව බර අනුව ලබා දීම.

දෙවන සතිය තුළ -

පැල්මොනෙල්ලොසිස් සඳහා එන්නත් කිරීම.

තෙවන මාසය තුළ -

නැවත ජීව බර අනුව පණු බෙහෙත් දීම. තෙවන මාසයේ සිට හය හත මාසය දක්වා - පහත රෝග සඳහා එන්නත් ලබා දීම.

කුර හා මුව රෝගය  
ගව රක්තපාතය  
රික්ටසෙඩ්  
ඇන්ත්‍රැක්ස්  
කාල ගාත්‍ර රෝගය

**7. නිවාස සැපයීම**

වසු පැවරුන්ගේ කුඩුවලට හොඳින් හිරු එළිය හා වාතාශ්‍රය ලැබීම අත්‍යවශ්‍යය. සාමාන්‍යයෙන් වර්ග අඩි 24 ක් පමණ කුඩු ඉතා යෝග්‍යයි. මේ කොටුවල ජල බඳුන් හා ආහාර බඳුන් සිබීම අවශ්‍ය වේ. පැවරුන් තනි තනිව මෙන්ම කණ්ඩායම් ලෙස ද පාලනය කළ හැකි අතර, මවුන් ලෙව් කා ගැනීමෙන් රෝගී තත්ත්වයට පත්විය හැකි නිසා මුල් සති කීපය තුළ තනි තනිව පාලනය කිරීම වැදගත් වේ.

**පශු වෛද්‍ය ටී. එන්. ජයතිලක**

සමග සාකච්ඡා කළේ  
පී. ආර්. වීරක්කොඩි

මෙම සඟරාව සැකසීමේදී පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී පී. පියරත්න මහතාගෙන් ලැබුණු සහයෝගය අගය කරමු.

- කර්තෘ