

කොමිපෝස්ට්: ගෙවතු වගාවට අත්වැලක්

නිතර වගා කිරීමේදී පසේ ස්වාභාවික පොහොර ගුණය නොපවතී. මේ නිසා ස්වාභාවික පොහොර ගුණය පවත්වා ගැනීමට හා ඉක්මනින් පැලෑටි වැඩීමට අවශ්‍ය පොහොර පසට යෙදිය යුතුවේ. එලවළු වගාවන්හිදී පැලෑටි කොටස්, පසට යෙදීමට අවශ්‍ය වන්නේ එබැවිනි. ඒ නිසා ගොම් පෝර, එළු පෝර, කොමිපෝස්ට්, කොළ පෝර හෝ හොඳින් දිරා කුකුල් පෝර සැම කන්නයක් පාසාම යෙදීම ඉතා වැදගත් වේ. වැලි සහිත කොටුවලට මෙම ද්‍රව්‍ය, නොවරදවාම යෙදීම අවශ්‍යවේ. එමගින්

යෙදිය හැකි ඉතාමත් වටිනා ඉන්ද්‍රිය වත් පොහොරකි. ඉවතලන සියළුම ඉන්ද්‍රියවත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් හෝග වගාවට අත්‍යාවශ්‍ය වටිනා පැලෑටි අහාර අඩංගු කොමිපෝස්ට් සකස් කර ගත හැක. එය විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් රැසක ප්‍රතිඵලයක් වේ.

දින 12 ක්‍රමය — වගුව

කොමිපෝස්ට් යනු අත් කිසිවක් හොඳ, දිරාගත ඉන්ද්‍රියවත් ද්‍රව්‍ය වේ. එය සැටට පහසුවෙන් සකසා ගත හැකි පූර්ණ පැලෑටි ආහාරයකි.

යොදන ද්‍රව්‍යයන්ගේ කැබලි ප්‍රමාණය කුඩා වූ තරමට ඉක්මනින් කුණු වී දිරාපත් වීම ඉක්මන් වේ. කැබලි සෙ.මී. 10-15 වඩා දික් නොවිය යුතුය. මේ නිසා අපද්‍රව්‍ය ඇසිරීමට පෙර කැබලි කර ගත යුතුය. පොලිතින් හා කොහු වැනි දිරීමට අපහසු ද්‍රව්‍ය මේ සඳහා යෙදීම සුදුසු නොවේ. මනාව කලවම් කර සෙ.මී. 15 ක පමණ තවටුවක් ලෙස අතුරන්න. ඒ මත ජලය වත්කර නැවත මෙවැනි සෙ.මී. 15 20 තවටු කීපයක් යෙදීමෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ (කන්දක්) ගොඩක් ලබා ගත හැක. මෙවැනි ගොඩක් එක් දිනකදී සම්පූර්ණ කර ගත යුතුය.

පළමු පෙරලීම:

කඳු සකස් කර දින දෙකකට පසු හැවත මිශ්‍ර කළ යුතුය. කඳු පෙරලා කලවම් කිරීමේදී වට රවුමේ හා අඩියේ කැන්පත්ව තිබූ කොටස් කඳු මැදට වැටෙන සේ නැවත සකස් කළ යුතු වේ. ගව මුත්‍ර මිශ්‍ර ගොම් දියාරු පාඨපයන් සේ සාදාගත් දියරයෙන් හෝ මුත්‍ර මිශ්‍ර පස් ජලය සමග මිශ්‍ර කරගත් උකු පාඨපයකින් සැම තවටුවක්ම තෙත්කර නැවත ගොඩ සකස් කර ගන්න.

දෙවන පෙරලීම:

පළමු පෙරලීමෙන් දින 04 කට පසු හෝ කඳු ගසා දින 06 කට පසු නැවත පෙරලේ පෙරලා තවටු ලෙස හැවත ගොඩ ගසා සකස් කළ යුතුය. එම සැට තවටුවක්ට වතුරෙන් තෙත් කළ යුතුවේ.

තෙවන පෙරලීම:

දෙවන පෙරලීමෙන් දින 03 කට පසු හෝ කඳු සැකසීමෙන් දින 09 ගත වූ පසු නැවත පෙර ලේම පෙරලීම කර සැම තවටුවකටම වතුර ඉස තෙත් කළ යුතුය.

අවසාන පෙරලීම:

තුන්වන පෙරලීමට දින 03 කට පසු හෝ කඳු ගසා දින 12 ක් ගත වූ පසු පෙරලන විට දැව අහ සමග මිශ්‍ර කරන්න. ඉන්පසු කොත් ආකාරයට ගොඩ ගසා පොල් අතු වලින් ආවරණය කර තෙත්ව තබන්න. ටෙසේ දින 12 ක් ගොඩගසා තැබීමෙන් පසුව (සකස් කර දින 24 කට පසු) කොමිපෝස්ට් වශයෙන් පාවිච්චියට ගත හැක.

(28 පිටුව බලන්න)

කොමිපෝස්ට් පොහොර සෑද ගැනීම

දින 12 ක්‍රමය :

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

හාගරික කැලිකසල, — විටි අතුගා එකතු කරන පත්‍ර හා මල්	}	%70
හෝග ශේෂ — කපා ඉවත් කරන තෘණ		
නොමේරූ දඩු හා කොළ		
නිසරු බීමහි වැඩෙන පැලෑටි හා වල් වර්ග		
ජලජ පැලෑටි හා චින් කිරීමේ කර්මාන්තශාලා අප ද්‍රව්‍ය		
කුකුල් පොහොර — (සපයා ගත හැකි නම්)	}	1% — 2%
ගොවිපල් හා මස් මඩු අප ද්‍රව්‍ය		
මුත්‍ර මිශ්‍ර වූ පස් — (සත්ව හා මිනිස්)		
අමු ගොම	...	0.5% — 1%
බේකරි සහ මුහුණින්ගේ අළු	...	5%
පැරණි කොමිපෝස්ට්	...	15% — 20%

ජලය රඳා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩිවේ පෝෂණීය ගුණය වැඩිවේ. මැටි සහිත පස්වල මේවා යෙදීමෙන් ජලවහනය හා පාංශු වාතනය දියුණු කරයි. මෙම ද්‍රව්‍ය වැඩෙන පැලෑටි වලට අවශ්‍ය, පොහොර සපයන අතර සැම සරු පසකම අඩංගු විය යුතු සාධකයකි. මෙවැනි ඉන්ද්‍රියවත් ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමෙන් හිසුමස් නමැති ද්‍රව්‍ය මතු පසකුළු සෑදේ. සත්ත්ව හා පැලෑටි ශේෂ කුණු වීමෙන් ඇතිවන මෙය දුඹුරු පැහැයෙන් යුත් කුඩු විශේෂයක් වේ. හිසුමස් නොමැති පස් නිසරු පස් ලෙස සලකන අතර, එවැනි පස් තුළ ඇලෙන ගති යෙන් හෝ වියලි, බුරුල් ගතියකින් යුතුවේ. කොමිපෝස්ට් යනු පසට

කඳු සෑදීම :

මීටරයක් උසට හා මීටර දෙකක් පලලට වඩා නොවැඩි කඳු සකසා ගත යුත්තේ වාතාශ්‍රය මනාව ලැබිය යුතු බැවිනි. කන්දක දිග පිරවීමට සපයා ගත හැකි ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත වෙනස් වේ. අම්ලකර, ජලය හා පීඩාන්තක — දිරා පත් වීමට (කුණුවීමට) උපකාරී වන සාධකයන් වේ. නිතර මේවා ලබා දිය යුතුය. මේ නිසා නිතරම තෙත් කළ යුතුය. නැතහොත් අමු කොළ මුත්‍රා මිශ්‍ර පස්, හා අමු ගොම යනාදි ද්‍රව්‍යයන් මගින් මෙම සාධකයන් සැපයිය හැකි වේ.

කොමිපෝස්ට්

(13 වැනි පිටුවෙන්)

කාබනික ද්‍රව්‍ය පොහොර කෙ:පමණ ප්‍රමාණයක් යෙදිය යුතුදැයි නිශ්චිතව, තීරණය කිරීම තරමක් අපහසු නමුත් දළ වශයෙන් සෑම වර්ග මීටර 2 ක බිම් ප්‍රමාණයට කුඩයක් යෙදීම හෝ පැළ සිටුවීමේදී වලකට පෝර කුඩා 1/3 ක් යෙදීම සෑහේ. වලවල් පිරවීම සඳහා ඉන්ද්‍රියවත් පෝර හ:විත කරන් හා වූ අවස්ථාවලදී, එම ද්‍රව්‍ය මතුපිට පස් සමඟ මිශ්‍ර කර පොළොව මට්ටමින් උස්ව සිටින සේ පිරවීම කළ යුතුය. දින කීපයකින් මෙසේ පිර වූ පස් තැන් පත් වේ. ඉන් පසු පැළ සිටුවීම කළ යුතුය.