

ගෝ වා ව ව ව

ප්‍රායෝගික කෘෂි කර්මය

ගෝවා හෝගය ලංකාවේ වගා කරණ ඵලවත් අතර, වැදගත් ස්ථානයක් ගනී. මෙරට ඵලවත් වගා කරණ ගොවීන් අතර, ජනප්‍රිය හෝගයක් මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව අතර හොඳ ඉල්ලුමක් ඇති හෝගයකි. මෙරට වාසීන් ගෝවා නම්බා ආහාරයට ගැනීම සඳහා හා ව්‍යාංජන සෑදීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. ගෝවා බනිජ ලවන හා විටමින් හා වලින් පොහොසත්ය.

වගා කරන ප්‍රදේශයන්

පහතරට වියළි කලාපයේ, මැද රට තෙත් කලාපයේ, උඩරට අතර මැදි කලාපයේ හා උඩරට තෙත් කලාපයේ ගෝවා බහුල වශයෙන් වගා කරනු ලැබේ.

වගා කරන ප්‍රදේශවල නිර්දේශිත ප්‍රභේද:

1. වියළි කලාපය සඳහා

ප්‍රභේදය	වයස
1. කේ. ඩී. දෙමුහුම	70-80 දින
2. ලංකා ගෝවා	70 80 දින
3. කේ. කේ. දෙමුහුම	60-70 දින
2. උඩරට අතර මැදි කලාපය සඳහා

1. කේ. ඩී. දෙමුහුම	70-80 දින
2. කේ. කේ. දෙමුහුම	60-70 දින
3. හර්කියුලිස්	100-120 දින
3. තෙත් කලාපයේ උඩරට හැර ඉතිරි ප්‍රදේශ සඳහා

1. කේ. ඩී. දෙමුහුම 70-80 දින
4. උඩරට තෙත් කලාපය සඳහා

1. ඒ. එස්. දෙමුහුම	100-120 දින
2. එන්. එස්. „	100-120 දින
3. එස්. ඩී. „	100-120 දින
4. ග්ලෝරියා	100-120 දින

වගා කරන කාලය

විවිධ ප්‍රදේශ වල වගා කරන කිලයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ.


කෘෂි කර්ම නිලධාරී

පී. කේ. ඩී. ආර්. පෙරේරා
විසිනි

පහත දැක්වෙන්නේ විවිධ දේශ භූමික කලාපවල ගෝවා වගා

කරන ප්‍රධාන කාල සීමාවන්ය. නමුත් අවාරයන්හි ලැබෙන වැඩි මිල ලබාගැනීම සඳහා අවාරයන්හි ද ගෝවා වගා කිරීමට දැන් දැන් ගොවීන් පෙලෑඹන බව පෙනේ.

ගෝවා හෝගය ප්‍රධාන වශයෙන් මහකන්නයේදී සෑම ප්‍රදේශයකම වාගේ විශාල වහයෙන් වගාකරනු ලැබේ. පහතරට වියළි කලාපයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ තවත් දමා නොවැම්බර් මාසයේ කෙත්‍රයේ සිටවීම කරනු ලැබේ. උඩරට තෙත් කලාපයේ හැර තෙත් කල, පයේ අනිකුත් කොටස් වල ඔක්තෝබර් මාසයේ තවත් දමා නොවැම්බර් මාසයේ සිටවීම කරයි. උඩරට තෙත් කලාපයේ තවත්



දමිල අගෝස්තු මාසයේ සිට ජන වාරි දක්වා සිදුවන අතර, කෘත්‍රයේ සිටුවීම සැපතැම්බරයේ සිට පෙබරවාරි දක්වා කාල සීමාවලදී සිදු වේ. උඩරට තෙත්මැදි කලාපයේ සැපතැම්බරයේ තවත් දමා ඔක්තෝබරයේ සිටුවීම සිදු කරයි.

විවිධ දේශගුණික කලාපවල කුඹුරු ඉඩම් හා ජල පහසුකම් ඇති උස් ඉඩම් වල යල් කන්නයේදී ගෝවා වගා කරනු ලැබේ. උඩරට තෙත් කලාපයේ යල් කන්නයේ ගෝවා වගා කිරීම අනිකුත් කලාප වලට වැඩියෙන් සිදුවේ.

තවත් පාලනය

1. මීට කලින් ගෝවා කුලයේ (කෘෂිපරේ කුලයේ) හෝග දිගින් දිගට වඩා නැති ඉඩම් කොටසක් තවත් බිම් සඳහා තෝරාගත යුතු වේ. විශේෂයෙන් උඩරට තෙත් කලාපයේ ගෝවා තවත් සඳහා බිම් තෝරා ගැනීමේදී බරවා රෝග කාරක දිලීරයෙන් තොර පසක් සහිත බිම් කොටසක් තෝරා ගත යුතු වේ.

2. තවත් බිමේ බිම් පෙරලා හල්කැට රොඩු ආදිය ඉවත් කර ගත යුතු වේ. උඩරට හා මැදරට ආම්ලික පස් ඇති ඉඩම්වල තවත් දමන විට පස් ආම්ලිකතාවය අඩු කිරීමට තවත් බිමේ මාර්ග මීටර 1 කට හුණුහෝ ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 100 බැගින් බීජ සිංචීමට දින 14 කට පෙර යොදා ගත යුතු වේ.

3. අක්කර එකක තවත් පැල ලබා ගැනීම සඳහා මීටර 3 ක් දිග හා මීටර 1 (එකක) පළල උස් තවත් පාත්ති හඟක් අවශ්‍ය වේ, උස් තවත් පාත්ති මීටර 1 ක් පළල විය යුතු අතර, දිග ඉඩමේ ප්‍රමාණය අනුව කීරණය කර ගත යුතු වේ. සෑම උස් තවත් පාත්ති දෙකක් අතරම, සෙ: මී: 25 පළල

කාණු තිබිය යුතුවේ. තව වත් පාත්තිය උස සෙ: මී: 10 පමණ විය යුතුවේ.

4. හොඳින් තවත් පාත්ති මට්ටම් කර ගත යුතුවේ. ඉන්පසු හොඳින් හලා ගත් කොම්පස්ට් මිතුපිට පස් හා කර කරන ලද දහයියා 2:2:1 අනුපාතයෙන් මිශ්‍ර කර මීටර 3X1 උස් තවත් පාත්තියකට කුඩා 3 බැගින්, යොදා දැන කර ගත යුතුවේ. මෙවිට උස් තවත් පාත්ති මත ඉහත මිශ්‍රණයෙන් සෑදුණු සෙ: මී: 3 ක් පමණ ඝණකම් ඇති සාරයක් ඇතිවේ.

මෙම සාර නිසා තවතේ බීජ පැලවීම අවශ්‍ය තෙතමනය රඳා පැවතීම සිදුවන අතරම බීජ ගැල වීමේදී මුල්වලට සිදුවන හානියද මෙම මිශ්‍රණය නිසා තරමක අඩු වේ.

5. මිලඟ තවත් පාත්ති වල සිටිය හැකි රෝග කාරක දිලීර, බැක්ටීරියා හා හානිදායක කෘමීන් විනා කිරීම සඳහා තවත් ඒවායු කරණය සඳහා තවත් පාත්ති ගිනි තැබීම හා රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීම කලහැක. තවත් පාත්ති ගිණි තැබීම මගින්, ජීවානුකරණය කිරීමේදී පළමුව තවත් පාත්ති හොඳින් තෙත් කළ යුතුයි. ඉන් පසු සිදුරු හා දහයියා මාරුවෙන් මාරුවට තට්ටු වශයෙන් තවත් පාත්ති වල ඇතිරිය යුතු වේ. මෙසේ 8'' පමණ උසට තැන්පත් කිරීම සුදුසු වේ. ඉන්පසු වැඩි වේලාවක් ගිණි ගැනීම සඳහා සුළං අතට විරුද්ධ පැත්තෙන් ගිණි තැබිය යුතුවේ. මෙසේ දෙවතාවක් ගිණි තැබීමෙන් බොහෝ දුරට තවත් ජීවානු කරණය කිරීමට හැකිවේ.

පාංශු දිලීර නාශක යොදා ගෙන පසේ ජීවත්වෙන රෝග තාරක පාංශු දිලීර මර්ධනය කිරීම සඳහා

මෝරුව හා බ්‍රැසිකෝල් යන දිලීර නාශක දෙක යොදා ගත හැක. මෙම දිලීර නාශක දෙකේම පී. සී. එන්. බී. යන කෙටි නමින් හඳුන්වන රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගුය. නමුත්, බරවා රෝගය අධික උඩරට තවත් ජීවානුකරණය කිරීමට ගිණි තැබීම හා බ්‍රැසිකෝල් යොදා ගැනීම යෝග්‍ය වේ. මෝරුව ග්‍රෑම් 5 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දිය කර වර්ග මීටර් එකක තවත් ප්‍රදේශයකට යෙදිය යුතු වේ. තවත් බීජ සිංචීමට දින දෙකකට පෙර මෙසේ යෙදීම කළ යුතුවේ. බ්‍රැසිකෝල් යොදා ගැනීමේදී බ්‍රැසිකෝල් කීලෝ ග්‍රෑම් දෙකක් තවත් වර්ග මීටර් 100 ක ප්‍රමාණයට යෙදිය යුතුවේ. තවතේ බීජ සිංචීමට දින 7 කට බ්‍රැසිකෝල් යෙදිය යුතු වේ. තවත් ගිණිතබා නැතිනම් තවතේ ජීවත්වන හානිදායක කෘමීන් මර්ධනය සඳහා මෙතමයිටොස් (වෙළඳ නම වැමරෝන්) යෙදීම බීජ සිංචීමට පෙර කල යුතුවේ.

6. පාශු ජීවාහරණය කිරීමෙන් පසු තවත් හොඳින් මට්ටම්කර බීජ සිටුවීමට කටයුතු කල යුතුවේ. පාත්තිවල හරස් අතට එකිනෙකට සෙ: මී: 12.5 දුරින් (අඟල් 5 ක) සෙ: මී: 1 ක ගැඹුරක් ජෙලි බීජ සිටුවීම සඳහා සලකුණු කර ගත යුතුවේ. සලකුණු කරගන්නා ජෙලිවල ගැඹුර සෙ: මී: 1 කට වඩා වැඩි නොවිය යුත්තේ එවිට බීජ පැල වලට දියමලන් කැටේ රෝගය අධික විය හැකි නිසාය.

7. තවතේ පැලවෙන බීජ වලට හානි දායක දිලීර වලින්, සිදු වියහැකි හානි මර්ධනය සඳහා බීජ වලට පූර්ව බීජ ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ. ගෝවා බීජ ග්‍රෑම් 500 කට තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් කැප්ටන් මිශ්‍ර කිරීම හෝ කයිට්‍රිට් (වෙළඳ නම පෝමොල්) ග්‍රෑම්

දෙකක් ගෝවා බිජ කිලෝ ග්‍රෑම් එකකට මිශ්‍ර කිරීම මගින්, බිජ සඳහා පූර්ව ප්‍රතිකාර කළ හැක.

8. සලකුණු කරන ලද පේළි වල පූර්ව ප්‍රතිකාර කරන ලද බිජ දමා තුනී කල පසු ස්ථරයකින් වසා ප්‍රවේශයෙන් තද කල යුතුවේ මෙසේ බිජ තද කිරීම එකාකාර ප්‍රරෝගනයක් සඳහා වැදගත් වේ. බිජ ප්‍රරෝගනය වන තෙක් සිදුරු හෝ ගෝනි වලින් තවත් වසා දැමිය යුතුවේ. ඉන්පසු තවත් හොඳින් තෙත්වන තෙත් ගෝනි මතට හෝ සිදුරු මතට මල් බාල්දි යකිත් ජලය වත් කල යුතුවේ.

9. වියළි කාලගුණයක් පවතින මුල් දින තුන තුල දිනකට දෙවරක්ද ඉන්පසුව දිනකට වරක්ද ජලය සැපයීම කල යුතුවේ.

10. ඕර පැලවීමත් සමග තවත් වසා ඇති ගෝනි හෝ සිදුරු ඉවත් කළ යුතුවේ. කියත් පත්‍ර භානිය හෝ දළඹු භානිය ඇතිවිය හැකි නිසා සුදුසු කාමිනාශකයක් දින 12 කට වරක් පමණ තවත් වසා දිය යුතුවේ.

දඩි හිරු රැස් වලින් හා වර්ෂා වෙන් තවත් ආරක්ෂාකර ගැනීම සඳහා තවත් වසා දඩි 2 1/2 පමණ ඉහළින් පොල් අතු හෝ පොළි කින් වලින්, ආවරණයක් සාදන යුතුවේ.

12. බිජ එකිනෙකට ඉතා ආසන්නව දමා ඇති නම් ප්‍රරෝගණයෙන් දින 10-12 පසුව පැල තුනී කිරීම කල යුතුවේ. මෙය බොහෝ විට කරන්නේ පළමු ශාඛ පත්‍ර දෙක ඇති වූ විටය. පේළි තුල සෙ: මී: 4-5 පරතරයක් පැල අතර, ස්වෛරීය පැල තුනී කිරීම වැදගත් වේ.

13. සතියකට වතාවත් පමණ තවත් පාත්තිවල වල් පැල ගබඩා තවත් පැල හා වල් පැල අතර, තරඟකාරී බවක් ඇති වීම වලකා ගත යුතුවේ.

14. ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට තවත් තෙත් පැල ගැලවීමට දින 10 කට පෙර තවත් පැල දඩි කිරීමට පියවර ගත යුතුය. මේ සඳහා ජලය සපයන කාලාන්තරය දීර්ඝ කිරීම හා ක්‍රමයෙන් තවත් වැඩි වේලාවක් හිරු රැස් වලට භාජනය කිරීම වැදගත් වේ.

15. තවත්තෙන් පැල ගැලවීමට දිනකට පෙර තවත් පාත්ති හොඳින් තෙත් කල යුතුවේ. මේ මගින් පැල ගැලවීමේදී තවත් පැලවල මුල් වලට වන හානිය අඩු කර ගත හැකිවේ.

16. උඩරට ප්‍රදේශවල නම් සිට වීම සඳහා තවත් පැල ගැලවීම කල යුතු වන්නේ තවත් වසා දින 4-5 ත් අතර, කාලයක් ගත වූ විටය. පෙසු ප්‍රදේශ වල සති 3-4 කදී පවත් පැල ගලවා සිවවිය යුතු වේ. මේ අවස්ථාවේ පැලයේ පත්‍ර 4-5 තිබීම වැදගත් වේ.

17. විශේෂයෙන් රෝගී පැල (විශේෂයෙන් මුල් ඉදිම ඇති බරවා රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන පැල) හා දුර්වල පැල සිට වීම සඳහා තෝරා ගත යුතු නැත.

18. තවත්තෙන් යම් පැල ප්‍රදාණයක් පාලු සිටුවීම සඳහාද භාවිත කළ යුතුවේ.

ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම

ක්ෂේත්‍රයේ පස් සෙ: මී: 20 පමණ ගැඹුරට පෙරලා ගත යුතුවේ. ඉන් පසු හොඳින් කැට පොඩි කර ගත යුතුවේ. ආම්ලික පස් ඇති ප්‍රදේශ වල උදාහරණ වශයෙන් උඩරට තෙත් කලාපයේ ගෝවා වගා