

තක්කාලි වගාව

ලයිකෝපර්සිකන් එස්කියුලේටම් යන උද්භිද විද්‍යාත්මක නමින් හඳුන්වන තක්කාලි ශාඛය සොලනෙසියේ කුලයට අයත්ය. වියළි කලාපය, උඩරට අතර මැදි කලාපය, තෙත් කලාපය (උඩරට තෙත් කලාපය හැර) යන දේශගුණික කලාප වල සාර්ථකව වගා කළ හැක.

තක්කාලි වල අඩංගු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අතර ඔනිජ ලින දින සෝඩියම්, පොටෑසියම්, සල්ෆර්, කැල්සියම්, හා යකඩ අඩංගු දින අතර විටමින් ඒ හා විටමින් සී ද අඩංගුවේ. මෙයට අමතරව වැදගත් ඇමයිනෝ අම්ලද ඕක්සලික් අම්ලයද සුළු ප්‍රමාණ වලින් අඩංගුවේ.

නිර්දේශිත ප්‍රභේද :-

1. කටුගස්තොට ඩබ්ලිව්. ආර්.
2. ටී 146
3. මාග්ලෝබ්
4. රොමා
5. බියැන්ස්

විවිධ දේශගුණික කලාප සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රභේද :-

1. තෙත් කලාපය (උඩරට තෙත් කලාපය හැර)
(අ) කටුගස්තොට ඩබ්ලිව්. ආර්.
2. උඩරට අතර මැදි කලාපය
(අ) කටුගස්තොට ඩබ්ලිව්. ආර්.
(ආ) මාර්ග්ලෝබ්
(ඇ) බියැන්ස්
3. උඩරට වියළි කලාපය
(අ) රොමා
(ආ) බියැන්ස්
4. පහත රට වියළි කලාපය
(අ) කටුගස්තොට ඩබ්ලිව්. ආර්.
(ආ) රොමා

වගාව පිහිටුම් කාලය :-

වගා කරන කාලයන් විවිධ ප්‍රදේශවලට ලෝභී වර්ෂාව ලැබෙන කාලයන් අනුව සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක. නමුත් පොදුවේ



එළවළු

ප්‍රවාහන

කෙරෙන

අවස්ථාවක්

වියළි කලාපයේ යල් කන්නය සඳහා තවත් දැමීම මාර්තුමේ මැද සිට මැයි දක්වා සිදුවේ. පොදුවේ වියළි කලාපයේ මහ කන්නය සඳහා තවත් දැමීම නොවැඩිමර් මාසයේ මැද භරියේ සිදුවේ. උඩරට අතර මැදි කලාපයේ සහ තෙත් (උඩරට තෙත් කලාපය හැර) යල් කන්න සඳහා අප්‍රේල් මැදද, මහ කන්න සඳහා නොවැඩිමර් මැදද තවත් දැමීම සිදුවේ. අවාරයේ ලැබෙන අධික මිළ ලබා ගැනීම සඳහා අවාර යන්හිදී තක්කාලි වැවීමට සමහර ගොවීන් පෙලඹී ඇත.

තවත් පාලනය :-

01. වටපනු රෝග, මිටු මැරීමේ රෝගය හා දිය මලන්කෑමේ රෝග වලින් තොර, හොඳින් හිරුළු ලැබෙන, ජල වහනය හොඳින් සිදුවන ස්ථානයක් තවන සඳහා තෝරා ගත යුතුවේ. අක්කරයකට පැල ලබා ගැනීමට වීමර 3 X මීටර 1 උස්තවත් පාත්ති 10 අවශ්‍යවේ තෝරා ගත් ස්ථානයේ පස ආම්ලික නම්, තවතෙන් වර්ග මීටර 3 කට ඩොලම් සිට කිලෝ ග්‍රෑම් 1/2 ක් 1 ක් අතර ප්‍රමාණයක් බීජ සිටුවීමට සකි දෙකකට පෙර යෙදිය යුතුවේ.

කෘෂිකර්ම නිලධාරී
[(පුහුණු හා සංවිකේදන)
පී. කේ. කේ. ආර්. පෙරේරා විසිනි

02. හලාගත් මතුපිට පස් හා හලාගත් කොම්පෝස්ට් 1 : 1 අනුපාතයට මිශ්‍රකර යාද ගන්නා තවත් මිශ්‍රණයක් කුඩා 10 ක් මීටර 3 X 1 තවත් පාත්තියකට යෙදිය යුතුවේ.
03. තවතා හෙත් කර ගිණි හැඩීමෙන් පසේ මොරුව, කැප්ටාන් වැනි දිලීර නාශක යන් හා කෘමි නාශකයක් භාවිතා කර තවත් පාත්ති හැකි තාක් දුරට පිටානුහ රණය කරගත යුතුය.

04. පෙ. මි. 1 ක් ගැඹුරුකි එකිනෙකට පෙ. මි. 15 දුරුකි පේලි තවතෙන් සලකුණු කරගත යුතුය. බීජ අවශ්‍යතාවය අක්කරයට ග්‍රෑම් 125-150 අතරවේ. බීජ සිටුවීමට පෙර බීජ වලට බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම සුදුසුය. තක්කාලි බීජ කිලෝග්‍රෑම් එකකට කයිරුම (වෙළඳ නම පොම්සාල්) හෝ කැප්ටාන් ග්‍රෑම් දෙකක් මිශ්‍ර කළ යුතුය.

05. වසුන් කර ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. සතියකින් පමණ බීජ ප්‍රරෝහණය වන විටත් සලිහ වසුන ඉවත් කළ යුතුය. බීජ සිටුවීම් විශෙ කුහුඹුවන් ගෙන් හා වෙයන්ගෙන් බීජ වලට හානි සිදුවිය යුතුය. බීජ ප්‍රරෝහණය වීමත් සමඟ කියත් පණු හානිය අධික ප්‍රදේශවය සුදුසු කෘමි නාශකයක් යෙදිය යුතුය. (කෘමි මර්ධන කොටස බලන්න) තවත් පැල වල පත්‍ර වලට හානි කරන දළඹු හානි මර්ධනය සඳහා මොනොක්‍රොටපස් නම් (වෙළඳ නම මොනොක්‍රොටපස්, නුවක්‍රොන්, ඇසොඩරින් හා මොරිපස්) කෘමිනාශකය යෙදිය යුතුය.

06. තක්කාලි තවත් වලට හෙත් කාලගුණයක් ඇති වීම පස්වත් අංගමාර රෝගය ඇතිවිය හැක. එය මර්ධනයට ඇත්තකොල් ප්‍රෙසකොල් එරොන්, පොලිරාම් එම්, වොන් සෙසඩ් වැනි දිලීර නාශකයක් ඉසීම කළ යුතුය. දියමලන් කෑමේ රෝගයද ඇති විය හැකි අතර තවත් පාත්ති පිටානුහ රණය, බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම, නිසි ගැඹුරට බීජ සිටුවීම තවත් පස් හෙත්මනය පාලනය කිරීම වැනි ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කළ යුතුය.
(33 වන පිටුව බලන්න)

තක්කාලි වගාව

(29 වෙනි පිටුවෙන්)

මනය කිරීමෙන් එම රෝගය ඇති වීම
 උළකා ගැනීමට හැකිවේ. වල් මර්ධනය
 දිරිමත් පැල ලබා ගැනීමට ආධාර වේ.

07. තක්කාලි වල තාවාන් කාලය දින 15කි.
 තාවාන් පැල ගැලවීමට දින පහකට පෙර
 සිට ජලය සැපයීම අඩුකර හා හිරු රැස්
 වලට හොඳින් ක්‍රමයෙන් හුරු කිරීමෙන්
 තාවාන් පැල දැඩි කිරීමට කටයුතු කළ
 යුතුවේ. තාවාන් පැල ගැලවීමට පෙර
 දින තාවාන් හොඳින් තෙත් කළ යුතුවේ.

08. සමහර ගොවීන් ගිල්ලු තාවාන් ද, තවත්
 සමහර ගොවීන් කුට්ටි තාවාන්ද තක්කාලි
 තාවාන් සඳහා භාවිතා කරයි.

ක්ෂේත්‍රය සකස් කිරීම :-

බිම පෙරලා කැටි පොඩි කර මට්ටම කර
 ගත යුතුවේ. පසේ ආම්ලික බව අධික ඉඩම්
 වලට පැල සිටුවීමට සත් දෙකකට පෙර බොල
 මිඩිට දමා පස සමඟ කලවම් කළ යුතුවේ.
 උස් පාත්ති, උස් පලල් පාත්ති හෝ වැටි සහ
 කානු ලෙස බිම් සකස් කර ගෙන පැල සිටු
 වීම කළ හැක. හොඳ ජලවහනයක් ඇතිවන
 සේ බිම සකස් කර ගැනීම වැදගත් වේ.

සිටුවන පරතරය :

කටුගස්කොට ප්‍රභේදය සඳහා සෙ. මි. 60 X
 සෙ. මි. 50 පරතරයද, ළාර්ග්ලාබි සඳහා සෙ.
 මි. 75 X සෙ. මි. 40 පරතරයද ඇතිව එක
 මිලක එක පැලය බැගින් සිටුවීමට නිර්දේශ
 කර ඇත. සිටුවන ස්ථානවල කුඩා වලවල්
 සකස් කර හොඳින් දිරු කාබනික පොහොර
 යොදා පස සමඟ මිශ්‍ර කර ගත යුතුවේ, පැල

සිටුවා දින 7 සිට දින 10ක පසු නිර්දේශිත
 මූලික රසායනික පොහොර පැල වටා හොඳයි.

පැල සිටුවීම :-

දින 14 පමණ වයසැති නිරෝගි දිරිමත්
 තාවාන් පැල මුල් වලට අවම භාතියක් සිදුව
 නසේ ගලවා ගත යුතුය. පැලවල කරව් කැඩී
 මෙන් වැලකී සිටිය යුතුය. සවස් කාලයේ
 තාවාන් පැල සිටුවන්නේ නම් වඩා යෝග්‍ය වේ.
 පැල සිටවූ විගස ජල සම්පාදන කළ යුතුය.
 අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අර්ත සිටවූ පැල වලට
 සෙවන සැපයීම කළ යුතුය. ප්‍රදේශයේ කීයත්
 පත්‍ර භාතිය අධික නම් පැල සිටවූ විගස සුදුසු
 කෘමි නාශකයක් ඉසිය යුතුය.

ජල සම්පාදනය :-

පැල සිටුවා දින හතරක් හෝ 5 ක් යන
 තුරු දිනපතා ජලය සැපයීම කළ යුතුය. පැල
 මුල් අල්ලා ගැනීමත් සමඟ ජලය සපයන
 කාලාන්තරය ක්‍රමයෙන් යැඩි කර දින හතරකට
 වතාවක් වියලි කාලගුණයකදී ජල සම්පාදනය
 කළ යුතුවේ. ක්‍රමවත් හා අවස්ථා ජල සැපයු
 මක් මල් ගවහන්සා කාලයේදී හා පොඩි වර්ධ
 නය වන කාලයේදී තිබීම ඉතා වැදගත්වේ.

වල් මර්ධනය :-

සෑම විටම බෝගය සමඟ වර්ධනය වන
 වල් පැලෑටි මර්ධනය කිරීමට පියවර ගත
 යුතුවේ. වල් පැලෑටි වල වර්ධන වේගය හා
 වල් ගහණය අනුව වල් මර්ධන දෙකක් අතර
 කාලය හා වල් මර්ධනය කළ යුතු වාර ගණන
 වෙනස් වේ.

පොහොර යෙදීම :-

පැල සිටුවන වලවල් වලට පැල සිටුවීමට
 දින පහකට හෝ හයකට පෙර කාබනික

පොහොර යොද පස සමඟ කලවම් කල යුතුවේ. පැල සිටුවා දින 7 සිට දින 10 අතර කාලය කදි පැල වටා අඟල් 2 හෝ 3 ක් ඇතිත් කවා කාරව මුලික රසායනික පොහොර යෙදිය යුතුවේ. 16: 20: 12 එන්. 8. කේ. මිශ්‍රණය (එළළු අල පොහොර මිශ්‍රණයෙන්) තක්කාලි වගාවේ මුලික පොහොර මිශ්‍රණය ලෙස නිර්දේශ කා ඇත. මෙම මිශ්‍රණයෙන් අක්කරයට කි. ග්‍රෑ. 250 යෙදී වට නිර්දේශ කර ඇත. පොහොර යෙදීමෙන් පස වගාවට පලය සැපයීම කල යුතුවේ, පැල සිටුවා සති 6 කට පසුව යුරියා කි, ග්‍රෑ. 50 අක්කරයට යෙදීමට නිර්දේශිතය,

කප්පාදු කිරීම හා ඉති සිටීම :-

කප්පාදු කිරීම කටුගස්තොට ප්‍රභේදය සඳහා එතරම් අවශ්‍ය නොවේ. අනිකුත් නිර්දේශිත සියළුම ප්‍රභේද සඳහා යම් ප්‍රමාණයක කප්පාදු කිරීමක් අවශ්‍යවේ. කප්පාදු කිරීමෙන් ශාකයේ වර්ධක වර්ධනය පාලනය කරන අතර විශාල ගෙඩි සහිත අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිවේ. තක්කාලි ගස්වල මල් ෪ට ගැනීම ශාකයේ පාදයේ සිට 6 වෙනි හෝ 7 වෙනි පත්‍ර කක්ශය යනගෙන් පාරම්භවේ. කප්පාදු කිරීමේදී පත්‍ර කක්ෂවල ඇති වර්ධක අංකුරයන් ඉවත් කරයි. පත්‍ර කක්ෂවල (6 වෙනි හෝ 7 වෙනි පත්‍රයෙන් පසු) වර්ධක අංකුරයක්ද දකුණට ලැබේ කප්පාදුවේදී ප්‍රධාන කඳට හා තවත් ශාකා එකකට හෝ දෙකකට පමණක් වර්ධන වීමට ඉඩ දෙමින් ඉතිරි සියළුම වර්ධක අංකුර කුඩා කාලයෙදී ඇහිලි කුඩු වලින් පෙලා ඉවත් කල යුතුවේ. කුඩා කාලයේදීම පත්‍ර කක්ෂවල ඇති වර්ධක අංකුර හා ප්‍රෂ්ප අංකුර දෙකින් කර ගෙන හඳුනා ගත හැක. සෑම ප්‍රෂ්ප අංකුරයකින්ම

නිරෝගි ගෙඩි තුනක් හෝ පහක් අතර ප්‍රමාණයක් ඇතිවේ. සෑම තක්කාලි ප්‍රභේදයකටම ඉති සිටුවීම කල යුතුවේ. ප්‍රධාන කඳ අඩි 1 පමණ උස්වූ විට ඉන්නට තබා ප්‍රවේශයෙන් බැඳිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4-5 උස ඉති මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

අස්වනු නෙලීම :-

වගා කරන ප්‍රභේදය අනුව අස්වනු නෙලීමට ගතවන කාලය වෙනස්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙය පැල සිටුවා මාස දෙකයි සති දෙකේ සිට මාස තුන දක්වා වේ. ගෙඩි සම්පූර්ණයෙන් ඉදි වට පෙර නෙලා ගත යුතුවේ. දිගු වෘත්තයක් ඉතිරි නොවන සේ ගෙඩි නෙලා ගැනීම මගින් ගබඩා කිරීමේදී හා ප්‍රවාහනයේදී එමගින් වන හානි අඩු කට ගත හැක.

ඇසිරීම :-

ඇසිරීමට පෙර ගෙඩි වල ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කරනු ලැබේ. තේපය තැලීම වැකා වලකා ගැනීම සඳහා ලී පෙට්ටි වල අසුරා පේළඳ පොලට යවනු ලැබේ.

අස්වැන්න :-

තක්කාලි වලින් ලැබෙන අස්වනු ප්‍රමාණය ප්‍රභේදය, විවිධ රෝපන කටයුතු කල ආකාරය, වගා කාලය තුල පැවති දේශගුණික තත්වය ආදිය අනුව වෙනස් විය හැක. සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයට කි. ග්‍රෑ. 8500 සිට 11000 දක්වා අස්වැන්නක් ලැබේ.

