

වැඩි ලාබ ලැබෙන තාරාටුන් පාලනය

ශ්‍රී ලංකාවේ කුකුලන් ඇති කිරීමේ කර්මාන්තය හා සසඳා බලන විට තාරාටුන් ඇති කිරීම සාපේක්ෂ වශයෙන් කුඩා කර්මාන්තයකි. මෑත අවුරුදු කීපය තුළ කුකුල් පාලනයේ සිසු වර්ධනයක් පෙනෙන්නට තිබූ නමුත් ඒ හා සමාන දියුණුවක් තාරාටුන් නිෂ්පාදනයේ සිදු නොවීය. තාරාටුන් ඇති කිරීම පිළිබඳව ගොවීන්ගේ දැනුම මදකමත්, එම නිෂ්පාදන ජනතාව අතර ජනප්‍රිය නොවීමත් සහ මෙම කර්මාන්තය පිළිබඳව ව්‍යාප්ති කටයුතු වල අඩුපාඩුවත් මේ සඳහා ප්‍රධාන හේතූන් වශයෙන් දක්විය හැක. ඒ කෙසේ වෙතත් කුකුලන් ඇති කිරීමේ දී ලැබෙන ප්‍රයෝජන වලට වඩා, තාරාටුන් ඇති කිරීමෙන්

උද්‍යෝගයක් වශයෙන් : බිත්තර දමන තාරාවියකට බිත්තර දුසිමක් නිෂ්පාදනයට ආහාර කි.ග්‍රෑ. 3.1 ක් පමණ අවශ්‍ය වන අතර කිකිළියකට මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ කි.ග්‍රෑ. 2.0 පමණි. එලෙසම මස් වර්ගයේ තාරාවකුගේ ආහාර පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාව 3.8:1 ක් පමණ වන අතර මස් වර්ගයේ කුකුලකුගේ එය 2.5:1 පමණ වේ. ආහාර පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාව එසේ අඩු වුවත්, මෙම සතුන්ගේ ආහාරයට ඉවන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය, ගොළු බෙල්ලන්, පත්‍රවත් කෘමීන්, ගුණයෙන් අඩු පෝෂිත භීන ආහාර, සහ නොයෙකුත් පලා වර්ග අඩංගු කළ හැකි බැවින්, ඒ මාර්ගයෙන් ආහාර වියදම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුකර ගත හැක.

පශු වෛද්‍ය නිලධාරී

එස්. පී. ගුණරත්න

විසිනි

ලැබෙන සමහර විශේෂ ප්‍රයෝජන, දැනට ප්‍රමුඛතාවයක් දී ඇති කුඩා පරිමාණයේ සමුදාන ගොවිපල සංකල්පයක් අනුව සලකන විට නොසලකා හැරිය හැකි නොවේ.

තාරාටුන් ඇති කිරීමේ වාසි

පරිසර පිඩනයන්ට ඔරොත්තු දීමේ වැඩි ශක්තියක් ඇති තාරාටුන් කුකුලන් මෙන් පහසුවෙන් ලෙඩ වලට භාජනය නොවේ. අපේ රටේ දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ පැවැත්වී සිටි දෙකක් හෝ තුනේදී පමණ රැලෙන් වෙන් කළ හැක. මරණ සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ඉතා අඩු ය. තාරාටුන්ට සාපේක්ෂ වශයෙන් සරල සහ ලාබාදයක නිවාස සැහෙන අතර ඔවුන්ට අයහපත් තත්ත්වයන්ට, ඔරොත්තු දීමේ වැඩි හැකියාවක් ඇත. බිත්තර දමන තාරාවියක් අවුරුද්දක දී කිකිළියකට වඩා බිත්තර 30ටත් 50ටත් අතර වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන අතර ඔවුන්ගේ බිත්තර ප්‍රමාණයෙන්ද විශාලය. මස් සඳහා ඇති කරන තාරාටුන්, මස් සඳහා ඇති කරන කුකුලන්ගේ වර්ධනය අහිමිවයි. එහෙත්, මෙහිදී සැලකිය යුතු කරුණක් වන්නේ මේ අවස්ථා දෙකෙහිදීම ආහාර පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාව කුකුලන් ගේ තරම් සතුටුදායක නොවීමයි.

තාරාටුන් වර්ග:

(1) මස් පිණිස ඇති කිරීමට සුදුසු තාරා වර්ග

(අ) මස්කොව් (Muscovy) : දකුණු ඇමෙරිකාව මුල් කරගත් වර්ගයක් වන අතර (මුලාඩ් (Mullard) නැතහොත් වල් තාරාවා (wild duck) ගෙන් ඇති වූ අනෙක් තාරා වර්ග වලට සමානකම් නොදක්වයි. මස්කොව් තාරාවන් වර්ග හතක් පමණ සිටින නමුත් ඉන් වඩාත් ජනප්‍රිය සුදු වර්ගයයි. මොවුන්ගේ ශරීරය දිගින් සහ පළලින් යුක්ත වන අතර මුහුණ පිහාටු වලින් තොර දිස්වීමත් රතු පැහැයක් ගනී. හොඳින් පියාඹීමට හා අනුලා කැමට හැකියාවක් ඇති නමුත් පුරුද්දක් වශයෙන් ඉබාගානේ නොයයි. දිග කියුණු නිය ඇති නිසා ඔවුන් ප්‍රවේශමෙන් ඇල්ලිය යුතුයි.

ගැහැණු සතා පිරිමි සතාට වඩා තරමක් කුඩාය. වැඩුණු පිරිමි සතෙකු රාත්තල් 10ත් 14ත් අතර වන අතර ගැහැණු සතෙකු රාත්තල් 5ත් 7ත් අතර වේ.

මස්කොව් පිරිමි සතාගේ පෙදෙසෙහි කැරකුණු පිහාටු නැති අතර, ගැහැණු සතා හඬ නොනගයි. වෙනත් තාරා වර්ග හා දෙමුහුන් කල විට ලැබෙන පැටවුන් වඳ බවක් දක්වයි. මස් කොව් තාරාවියන් බිත්තර දැමීම අතින් දුර්වලය.

මස් කොච්ච වර්ගය පාරිසරික පිඩාවන්ට හොඳින් ඔරොත්තු දෙන බැවින් පැටවුන් ඇති කිරීම පහසුය. ගැහැණු තාරාවියන් සති 14ක දී රාත්තල් 5ක් 5½ක් පමණ වූ විට වෙළඳ පොළට යවන අතර පිරිමි සතුන් සති 16 දී රාත්තල් 09ක් වූ විට වෙළඳ පොළට යැවීමට සුදුසු ය. මස්කොච්ච බිත්තර හා පැටවුන් රැකීමට දක්ෂය.

(ආ) පිකින් (Pekin) : චීනය මුල්කර ගත් වර්ගයකි. ශරීරය පළලින් යුක්ත වන අතර සෘජු ගමන් ලිලාවක් දක්වයි. පිහාටු ලා කහ පාටට හුරු සුදු පාටවින් යුක්ත වන අතර හොට සහ කකුල් දිස්නීමත් රතු මිශ්‍ර කහ වර්ණයෙන් යුක්තය. කම්මුල් ඉදිරියට නෙරා ඇති ඔවුන්ගේ ඇස්, සනව වැඩුනු ඇස් බැමි වලින් මදක් වැසෙයි. අවුරුද්දකට බිත්තර 120ත් 140 ත් අතර ප්‍රමාණයක් දමයි. ඔවුන් රැකීමෙන් කාලය ගත කරන්නේ කලාතුරකිනි.

පිකින් වහා කලබල වන සුළු සතෙකු නිසා ප්‍රචේශමෙන් ඇල්ලිය යුතුය. ඔවුන් කීකරු සතුන් වන අතර වැඩි උස නොවූ වැටක් තුළ පහසු වෙන් රඳවා ගත හැකිය.

වැඩුනු පිරිමි සතෙකු රාත්තල් 9 ක් පමණ වන අතර ගැහැණු සතෙකු රාත්තල් 8ක් පමණ වේ. සාමාන්‍යයෙන් සති 9 යේදී රාත්තල් 5½ පමණ වූ විට වෙළඳ පොළට යැවීමට සුදුසුය.

(2) බිත්තර පිණිස ඇති කරන තාරා වර්ග

(අ) කාකි කැම්පබෙල් (Khaki Campbell) : එංගලන්තයේ ග්ලොස්ටර්ෂයර් ප්‍රදේශයේ කැම්පබෙල් නැමැති මහත්මියක විසින් බෝ කරන ලද වර්ගයකි. කාකි කැම්පබෙල් තාරාවියන් ඉතා හොඳින් බිජු ලන්නේ ය. සාමාන්‍යයෙන් වසරකට බිත්තර 300 ඉක්ම වයි.

වැඩිහිටි කාකි කැම්පබෙල් තාරාවෙකු රාත්තල් 04 ක් 05ක් පමණ, අඩු බරකින් යුත් කුඩා සතෙකි. මාස 4½ පමණ වයසේදී බිත්තර දැමීම ආරම්භ කරයි.

(ආ) ඉන්ඩියන් රනර් (Indian Runner) : දකුණු ආසියා ප්‍රදේශයේ දියුණු කළ වර්ගයකි. කුඩා සතුන් වූ මේ වර්ගය ඔවුන්ගේ පැහැදිලි සෘජු ඉරියව් සිහින් දිග බෙල්ල සහ කෙටිවූ මනා පෙනුම, නිසා පහසුවෙන් වෙන්කර හඳුනාගත හැක.

ද්විකාර්ය තාරා වර්ග

(අ) වැලිව් (Value) : වසරකට බිත්තර 275 පමණ දමයි. මාස 5½ පමණ වන විට බිත්තර දැමීම ආරම්භ කරයි.

(ආ) බප් ඔර්පින්ටන් (Bupt orpinaton) : මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සතෙකි. එංගලන්තයේ කෙන්ට් ප්‍රදේශයේ ඔර්පින්ටන් හිදී බෝ කරන ලද්දකි.

බිත්තර රැක්කවීමේ කාලය : මස්කොච්ච වර්ගයේ දින 35 ක් වේ. අනෙක් වර්ග වල දවස් 28 කි.

පැටවුන් රැක්කවීම

තාරාවුන්ට දැඩි පරිසර පිඩාවන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ඇති අතර ඔවුන් රැක බලා ගැනීම පහසුය. මුල් දවස් කීපය තුළ සුදුසු ආහාර, පිරිසිදු ජලය, උණුසුම් සැපයීම අවශ්‍ය වන අතර තවත් වැදගත් කරුණක් නම් පැටවු රක්කනයේ වියළි බව සහ පිරිසිදු බවයි. තාරාවුන්ගේ පිහාටු හොඳින් වැවෙන තුරු ශීත සුළඟින් සහ තද වැසි වලින් ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍යය.

(අ) පැටවුන් රැක්කවීමේ ස්වභාවික ක්‍රමය.— තාරා පැටව්වුන් සුළු සංඛ්‍යාවක් සාර්ථක ලෙස තාරාවියක මාර්ගයෙන් රැක්කවිය හැක. හොඳට රකින තාරාවියකට 15 ත් 20ත් අතර පැටවුන් ප්‍රමාණයක් රැකිය හැක්කේ ඔවුන්ට ඉතා සමීප රැකීමක් අවශ්‍ය නොවන බැවිනි.

(ආ) පැටවුන් රැක්කවීමේ කෘතීම ක්‍රමය.—විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය නොවේ. කුකුලන් සඳහා යොදා ගන්නා ඕනෑම පැටවු රක්කනයක් මේ සඳහා යොදාගත හැක. එහෙත් මෙහි දී නිර්දේශ කර ඇති අවකාශ ධාරිතාව කුකුලන් ගේ මෙන් දෙගුණයකි. සති දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත කාලයේදී පැටවුන් රක්කන යෙන් ඉවත් කළ හැක.

රැක බලා ගැනීම

රක්කනයෙන් ඉවත් කළ පසු පැටවුන් කොටු තුළ හෝ නිදල්ලේ ඇතිකළ හැක. තාරාවුන්ට සරල නිවාස සෑහේ. නිවාස ඇතුළත වියළි බවෙන් සහ හොඳ වාතාශ්‍රයෙන් යුක්ත විය යුතු අතරතුද සුළඟින් ආරාක්ෂා විය යුතුයි.

කොටු තුළ ඇති කරන විට බර වර්ගයේ තාරා වෙකුට වර්ග අඩි 6 සිට 7 දක්වාත්, සැහැල්ලු වර්ග වලට අඩි 5 සිට 6 දක්වාත් ඉඩ ප්‍රමාණයන් අවශ්‍යය. කොටු හා ආවාරණය කරන ලද එළිමහන් හෝ ඇති කරන අවසන් වලදී වර්ග අඩි 3½ සිට 4 අතර ඉඩ ප්‍රමාණයක් කොටු ව තුළත් අවම වශයෙන් වර්ග අඩි 20 ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් එළිමහන් ආවරණය තුළත් ඉඩ තිබීම අවශ්‍යය. අහල් 24 ත් 30 ක් පමණ උස් වැටක් යෙදීමෙන් මෙම ක්‍රමයේදී සතුන් ඔවුන්ගේ කොටු වලට සීමා කළ හැක.

සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල කුඩා පෙට්ටි ලොකු පට්ටි වලට වඩා සාර්ථක බවක් පෙන්වයි. තාරාවුන්ට ජල පොකුණු අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නොවේ. එහෙත් සැමවිටම ඔවුන්ගේ හොට ගිල්වා ගැනීමට තරම් සැහෙන ජල ප්‍රමාණයක් තිබීම වැදගත්ය. ඒ කෙසේ වෙතත් තාරාවුන් පිහිණීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන අතර ජලයෙහි දී ඔවුන් වඩා පහසුවෙන් සංසර්ගයෙහි යෙදෙති. තවද, පිහිණීමට ජලය ඇති විට ඔවුන්ගේ බිත්තර වල සශ්‍රීකතාවයද වැඩි බවක් පෙන්වයි.

තාරාවුන් බියගලු සතුන් වන අතර පහසුවෙන් කලබල වේ. දින වර්ධාවේ හෝ කැමෙහි වෙනස් කිරීමක් මගින් ඔවුන්ගේ බිත්තර දැමීම වුවද නතර විය හැක.

තාරාවුන් බොහෝ විට හිමිදිරි උදෑසන නිරා නැගීමට පෙර බිත්තර දමයි. එබැවින් ඔවුන් උදේ 8.00 හෝ 9.00 පමණ වන විට එළියට යැවිය හැක. එහෙත් සමහර විට සතුන්ගේ බිත්තර මුරය අවසන් වන කාලයේදී සවස් භාගයේ දී බිත්තර කීපයක් දමනු ලබයි. බිත්තර දැමීම සඳහා බිත්තියට සවිකළ බිම මට්ටමෙහි වූ නොගැඹුරු බිත්තර පෙට්ටි සැපයීම සුදුසු නමුත් තාරාවුන් බොහෝ විට බිත්තර බිම දමයි.

පෝෂණය

කොටු හා ආවරණය කරන ලද එළිමහනේ ඇති කිරීමේ දී සාන්ද්‍ර ආහාර ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර ගේ දෙර අපෙතේ යන ද්‍රව්‍යය ද සපයා නිදල්ලේ අඹුලා කෑමට ද මුද හැරිය හැක.

සාන්ද්‍ර ආහාර සැපයීමේ දී දෙනු ලබන ආහාර මිශ්‍රණ බොහෝ විට කුකුළන්ගේ ආහාර මිශ්‍රණ වලට සමානය. මූලික වශයෙන් පැටවුන් වැඩෙන සතුන් බිත්තර දමන කිකිළියන් සහ බෝ කිරීම සඳහා ඇති කරන සතුන්ට ආදී වශයෙන් වෙනත් ආහාර මිශ්‍රණ හතරක් දීම අවශ්‍යය.

ආහාර වියළි, තෙත් හෝ කැට වශයෙන් දිය හැක. කැම නාස්තිය අධික නිසා ආහාර වියළි වශයෙන් දීම කරන්නේ මද වශයෙනි. පලා වර්ග නිතරම සැපයිය හැක. සෑම අවස්ථාවකම සිප්පි කටු හා සන කැට දීම කළ යුතුයි.

දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිදීම සතුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා ජලය සැපයිය යුතුය.

තාරාපැටවුන්ට මුලින් සපයන ආහාරය සති දෙකක් සපයා දෙ ලැබේ. එහි 20% පමණ ප්‍රෝටීන් අඩංගු විය යුතුය. වර්ධනයේ අනෙක් අවස්ථා සඳහා දෙන ආහාර මිශ්‍රණ වල 17% ප්‍රෝටීන් අඩංගු විය යුතුය. තාරා පැටවුන්ගේ රයිබෝජලේටින්, විටමින් ඒ නියැසින් මැන්ගනීස් ආදී පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වල අවශ්‍යතාවය කුකුළු පැටවුන්ට වඩා වැඩිය.

තාරා රෝග

කුකුළන් හා සසඳන විට තාරාවුන්ට වැලදෙන රෝග ප්‍රමාණය සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩුය. නමුත් බරපතල හානි ගෙන දෙන ඔවුන්ට විශේෂ වූ රෝග තිබේ.

(අ) තාරාවුන්ගේ අක්මා ප්‍රදහය (Duck Viral Hepatitis) : වයිරසයක් මගින් බෝවන, රෝගයකි. සති තුනක් දක්වා වයස් වූ, පැටවුන්ට බොහෝ විට මෙම රෝගය වැලදුන විට මුල් දවස් හය ඇතුළත වැඩි මරණ සංඛ්‍යාව සිදුවේ. මරණ ප්‍රතිශතය සියයට 80% සිට 90% දක්වා වේ. රෝග ලක්ෂණ වලට සමාන දුර්වලතාවය, මාංශපේෂ වල

(33 වන පිටුව බලන්න)

(25 පිටුවෙන්)

විශේෂයෙන්ම බෙල්ලේ මාංශ පේෂ පාලනය අඩුකම අයත්ය. වයිරසය ශරීර ගත කළ සතුන්ගේ ලේ වලින් ලබාගත් මස්තු මිලි ලීටර් 0.5 ඒ ක් එන්නත් කිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාරයයි.

(ආ) බොෂිලිසම් නැතහොත් ලිම්බර්නෙක් (Botulism or limber neck) දිරායන කාබනික ද්‍රව්‍ය වල ඇතිවන විෂ සතුන්ගේ ශරීරගත වීම නිසා මෙම රෝගය වැළඳේ රෝගය වැළඳුන සතුන් මරණයට මොහොතකට ප්‍රථම සම්පූර්ණයෙන්ම කොරවේ. මෙයට කරනු ලබන සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාරයක් වන්නේ සහිද ලුණු වැනි විරේචකයක් වතුරේ දියකර දීමයි.

(ඇ) ක්විල් නැතහොත් පිහාටු ඉගිල්ලීම (Quill or Feather Fulling) : සතුන් ඉඩකඩ මදි කොටුවක ඇති කරන විට ඇතිවන හරක

පුරුද්දකි. ආහාර මිශ්‍රණයේ ප්‍රෝටීන් සහ බණිස් ලවන උණනාවය මෙම පුරුද්දට බලපායි.

(ඈ) ඇස්පර්ගිලෝසිස් (Aspergilloses) පුස් වර්ගයක් නිසා ඇතිවන රෝගයකි. විශේෂයෙන්ම වයසින් බාල සතුන්ගේ මරණයට ඇති කරයි. රෝගයේ මූලය වන්නේ බොහෝ විට පුස් හටගත් සන ආස්තරය හෝ පුස් සහිත ආහාරයයි. රෝගය වැළඳී කල්ගවු විට සතුන් උදසින බවත්, ස්වසනයේ අපහසුතාවයෙනුත් සහ.මස් දිරායාමේ ලක්ෂණත් පෙන්වයි. පෙනහැල්ලේ ගැටිති දැකිය හැක. කොටුවල සන ආස්තරය හොඳින් තබා ගැනීමෙන් හා අලුත් ආහාර පාවිච්චි කිරීමෙන් රෝගය වලක්වා ගත හැක.

පැනවිසඳුම් තරඟය

සංස්කාරකවරුන්ට පාලනය කරගත නොහැකිවූ හේතුවක් නිසා පැනවිසඳුම් තරඟය මෙවර පළ නොවන අතර ලබන කලාපයේ සිට පළවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.