

බත රස කරන වට්ටක්කා



අපි පුංචි දවස්වල අපේ ගමේ හිටිය මල්හාමි මාමලා පිංහාමි මාමලා කිරිහාමි මාමලා වාගේ පැරණි උදවිය තම තමන්ගේ පිටි රවාටේ එක අංගයක් හැටියට හේන් ගොවිතැන කළේ බොහොම උනන්දුවෙන්. ඒ ගොල්ලන්ගේ හේන් පිට්ටල වගා කරපු බෝග ජාති අතරේ තැන් තැන්වල කිබුණ එක එක ප්‍රමාණේ විශාල වට්ටක්කා ගෙඩි. ඒ වගාව තමන්ගේ ඔහු එපාකම්වලට සැහෙන්න විතරයි කරන්න ඒ උදවිය පෙළඹුනේ.

කොහොම උනත් ඒ ගොල්ලෝ වට්ටක්කා වගාව කළේ අමුතම ක්‍රමයකට. අළුතෙන් වල් ගිනි නියලා හද ගත්ත නව දලි හේන් වල වැස්ස පුරනකොට හොඳට අළුතියෙන තැන් කීපයක් බලල ඒ තැන්වල යන්නමට වලක් කපලා ඇට කීපයක් හිටවනවා. දැස්සට පැලවෙල මාස 1 1/2 ක් විතර වැල් ඇඳෙනකොට හොඳට වල් තෙලලා මාස දෙකේදී විතර හිරමණ තලේකින් වැල්වල දළ කපනවා. ඊට පස්සේ වැල දිගට ඇඳෙන්නේ නැතිව වැලේ තැන් තැන්වලින් දළත් මලුත් පල ගන්නා. අන්න ඒ විදිහටයි අපේ ගම්මු එද වට්ටක්කා වගාව කළේ.

දැනක් වෙන තුරුම අපි කවු ඉන් වට්ටක්කා වගාව කෙරුවේ අපේ පැරන්තෝ කරපු ආකාරට. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට. ඔහොඳ ඉන්න අතරතුරේදී පමයි කෘෂිකර්මේ උගන්නන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ යෙල් ගුරුතුමා අපේ ස්තෝලට ආවේ. කෘෂිකාර්ම පාඩමේදී එතුමා ඉගැන්වුවේ නවීන ක්‍රමයට ගොවි තැන් කරන හැටි. දවසක්කා බෝගය ගැන එතුමා බොහොම යසට අපට කියලා දුන්නා. ගේබ්‍රී යෙල් ගුරුතුමා උගන්නපු වට්ටක්කා වගාව පිළිබඳ පාඨමේදී ඒ ගැන කියවුනේ ලෙන්න මේ විදියටයි.

දැනට අපේ රටේ වගාවෙන් වට්ටක්කා දිග සහ රවුම කියලයි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ. කුකබ්බේ කුලයට අයත් මෙම බෝගයෙහි උද්භිද නාමය කුකබ්බා මැක්සිමා යන්නෙන් හැඳින්වෙනවා. හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන වැලිලෝම පසේ සිට මැටිලෝම පස දක්වා පසක්ද, එපිට් අංශක 75 සිට 85 දක්වා උෂ්ණත්වය ඇති උෂ්ණ දේශ ගුණයක් හා උගා කාලය තුළ පැතිරුණු වර්ෂාපතනයක්ද මේ බෝගය හොඳින් වැඩීමට අවශ්‍යයි.

වට්ටක්කා ඇට හිට්ටන්න ඉස්ස රවෙලා හොඳට බීම සකස් කර ගන්න වෙනවා. හිට්ටන බීමේ කුණු රොඩු දලා පුළුස්සා ගන්නේ උළුබෝධකයන් වලක්වා ගන්නයි. ඊට පස්සේ බීම සීසාලා රනිල බෝගයක් වගා කරල ඒක පසට යටතර ගැනීම හෝ කොම්පෝස්ට් පෝර යොදලා හැරෝ කර ගැනීම හෝ කරන්න වෙනවා. බීම කැබැල්ල කුඩානම් උදලු මුල්ලු ආදියෙන් පෙරලා ගැනීම වඩාත් පහසුයි. පස සකස් කරගන්නට පස්සේ අඩි 10 ක පරතරයක් හිට්ටන වලවල් කපාගන්න ඕනෑ. වලක ගැඹුර හා පළල අඩු 1 1/2 ක පමණ විය යුතුයි. කපාගත් වල කට කොම්පෝස්ට් හෝ ගොම කුඩයක් හෝ එකහමාරක් යොද පසට කලවම් කරගන්න ඕනෑ. එම පසේ බීජ ඇට 4 බැගින් සිටුවිය යුතුයි. කෙළින්ම ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන මෙම බෝගය සඳහා අක්කරයකට බීජ ඇට රාත්තල් එකක් හෝ එකහමාරක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා.

ජලසම්පාදනය කරනවා නම් පැලවෙන තුරු දිනකට වරක් බැගින්ද පැලවී සති තුනකින්

පමණ පසු සතියකට වරක් බැගින්ද කල යුතුයි. බීජ පැලවීමට දින 4 ක් පමණ ගත වෙනවා. පැලවී සති දෙකකට පසු දුච්ච පැලදෙකක් ඉවත් කළ යුතුයි. වැල් ඇඳීමට කළින් වල් පර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා.

වට්ටක්කා වගාවේදී රසායන පෝර භාවිතා කරනවා නම් මූලික මිශ්‍රණය සඳහා :

යූරියා - රාත්තල් 186 2/3
සා:සු:පො: - රාත්තල් 311 1/9
මීයු: පො: - රාත්තල් 62 2/9

අක්කරයකට මිශ්‍රණය හොන්ඩර් 5 ක් යෙදිය යුතුය.

බෝග සිටුවා මසකට පසු නැවත මතුපිට යෙදීම කළ යුතුය.

යූරියා - රාත්තල් 37 1/3
සා:සු:පො: - රාත්තල් 62 2/9
මීයු: පො: - රාත්තල් 12 4/9

අක්කරයකට මිශ්‍රණය හොන්ඩර් 1 ක් යෙදිය යුතුය.

කැළණි විශ්ව විද්‍යාලයේ.
ඒ. හේරත් බංඩා
විසිනි

අනතුරුව මාස දෙකකට පසු තුන්වන මතුපිට යෙදීම කළ යුතුය. ඉහත මිශ්‍රණයෙන්ම අක්කරයකට හොන්ඩර් 1 බැගින් වන පරිදි යෙදිය යුතුය.

වට්ටක්කා බෝගයෙන් මාස තුනක් තුනහමාරක් අතර කාලයේදී අස්වනු නෙලන්න පුළුවන්. අක්කරයකට රාත්තල් 20000 ක පමණ මේ වගාවෙන් අස්වනු ලබා දෙනවා.

ඉස්සර අපේ ගම්වැසියෝ වට්ටක්කා වගාව කෙරුවේ තමන්ගේ ආහාරය සඳහා පමණයි. ඒත් අද ඒ සඳහා හොඳ වෙළඳපොලක් තිබෙනවා. අපේ ප්‍රංචි නංගිලා ඔල්ලිලාට මේක බොහොම පහසු වෙන් කරන්න පුළුවන් වගාවක්. තෑන්ගේ ගෙවත්තේ ගේ නෙ පිටියේ. කුඹුරේ සුදුසු තැනක මේ වගාව කරන්න පුළුවන්. නූතන ක්‍රම වශේම පැරණි ක්‍රමත් භාවිතා කරන මේ වගාව කළාම වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි පැරණි ක්‍රමවල සත්‍යයක් නැත්තේම නැහැ. වට්ටක්කා වගාවේදී දළ කැපීම ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. පැරැන්තෝ දළ කැපීමට භාවිතා කළේ. හිරිමණ තලයක්. ඒකක් ගොරෝසු බව හා තෙල් ගතිය නිසා දළ ඉක්මණින් සුව වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත.

ඔබට මහා පරිමාණ හෝ සුළු පරිමාණ වශයෙන් මේ වගාව කරන්න පුළුවන්. කොහොම උනත් වගාව කරනවා වෘත්තම කෘෂිකර්මයෙන් හා රෝග වලින් වගාව ආරක්ෂා කරගන්නත් වෙනවා. දත් අපි බලමු කෘෂිකර්ම මේ වගාවට හානි කරන්නේ කොහොමද කියලා.

අවුලකපෝරා, එපිලාග්නා, ඉල්මැස්සා, හබල්පාද මකුණා ආදී හානිදායක කෘෂිකර්මය සහ සුළු වශයෙන් හානි කරන රතු පස් මුළු මකුණා සහ ජලසීයා පොපොනිස් ආදී කෘෂිකර්මයෙන් මේ වගාව ආරක්ෂිත කරගත යුතුයි. අවුලක පෝරා කොල සහ මල් වලට හානි කරන අතර ඒ සඳහා බී.එච්.සී කුඩු, මැලකියන් ආදිය යෙදීම මැනවි. එපිලාග්නා පත්‍රවල අපි වරන කොටස් හෙවත් මදය කා දමයි. මැලකියන් පෙතිප්‍රෝනියන්

(30 වැනි පිටුවට)

බත රස

24 වැනි පිටුවෙන්

ආදිය ඒ සඳහා සුදුසුයි. ඉල්මැස්සා ලපටි ගෙඩි වලට භානි කරයි. ඒ සඳහා ලෙඩයිසිඩ් වැනි කෘමි නාශකයක් යෝග්‍යය. හබල්පාද දෙකුණා කඳන්වල සහ වැල්වල යුෂ උරාබීම නිසා පැලෑටි වියළීම හා එලවැටීම සිදුවෙයි. ඒ සඳහා මැලනියන් යෙදීම සුදුසුයි.

වට්ටක්කා වගාව සඳහා වැල දෙන රෝග අතර පිට්පුස් රෝගය සහ විවිත්‍ර වයිරස් රෝගය විශේෂ යක් ගනී. තෙතමනය වැඩිකර පිට්පුස් රෝගය වැළඳීමට හේතු

කාරකයකි. සිනෙබ් දීලීර නාශකය මෙම රෝගය සඳහා සුදුසුය. විවිත්‍ර වයිරස් රෝගය නිසා පත්‍රවල කොළපාට සහ කහපාට කොටස් ඇතිවේ. පසුව තද කොළපාට හෝ ලා කහපාට සහ කහපාට විවිත්‍රයක් සෑදේ. රෝගය වැළඳුණු පසු පළමුවෙන් පත්‍ර හැකිලී පුරාක් කඩා වී වැල් වැඩීම නවතී. මල් හට ගැනීම ද දුර්වල වේ. මල් මෙරීමට ප්‍රථමට ප්‍රථම වියළී ඇද හැලේ. විශාල වශයෙන් මෙම රෝගය පැතිරයන්නේ කුඩිත්තන් මාගියෙනි. කුඩිත්තන් මර්ධන යෙන් පැතිරයාම වළක්වා ගත හැක.

රෝගකාරක, කෘමි සත්තු ආදී සියල්ලටත් වඩා මේ රෝගය වැළඳීමට හේතු සැලකිලිමත් වන්නා වෙතවා වගා

කාලය තෝරා ගැනීම පිළිබඳව. දිග වැසි සමයක් ඇත්නම් එනම් මාස 4 ක පමණ අපට මේ වගාව වැසි ජලයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඒත් වැස්ස අඩු ප්‍රදේශවල වැසි සමය ආරම්භ වීමට මසකට පමණ පෙර බීම සකස් කර බීජ සිටුවා වෙනත් ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් යොදා ගැනීම තරමක් අපහසුමුත් වඩා වාසිදයකය. වැසි සමය ආරම්භවීමත් සමඟ වැල් වැඩීම ඉක්මන් වීම හා පල ලැබීමද ඉක්මන් වීම හා පල ලැබීමද ඉක්මන් වේ. ඒ නිසාම හොඳ වෙළඳ පොලක්ද ලැබෙනු ඇත. පූර්ණ කාලීන ජල සම්පාදනයට වඩා වැසි පලයේද උපකාරයෙන් මේ වගාව කිරීම වඩා පලදායීකද, වඩා පහසු දැයිකද වනු ඇත.