

* කක්කල් කැස්ස * ගලපටලය * පිටගැස්ම ඔබේ දරුවා රැකගන්න ගත යුතු පියවර මෙන්න

වනිතා ලතා

අවුරුදු පතා ජන සමාජයේ සෑම තරාතිර-
මකටම අයත් දරුවන්ගෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිලි
ගනු ලබන රෝග වලින් ඔබේ දරුවා ආරක්ෂා
කර ගැනීම ඔබගේ පරම යුතුකමකි. ඒ සඳහා
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිරතුරුව ඔබේ සහායට
සිටියි.

කක්කල් කැස්ස

වයසින් අවුරුද්දකට අඩු ළමයින්ගේ මාරක
සතුරා වන කක්කල් කැස්ස ප්‍රතිශක්තිකරණයේ
ආධාරයෙන් වළක්වා ගත හැකි ය.

ගලපටලය

ආරක්ෂාව ලබා දී නැත්නම් ගලපටලය එකල
මෙන් ම මේකල ද හයානක උවදුරකි. නමුත් ප්‍රති
ශක්තිකරණයේ ආධාරයෙන් මේ රෝගය වළක්වා
ගත හැකි වී තිබේ.

පිටගැස්ම.

ලොකු කුඩා කවර තුවාලයකට හෝ නො
දනුවන්වම ඇතුළු වන විෂ බීජ නිසා වැළඳෙන
පිටගැස්ම ප්‍රතිශක්තිකරණය නිසා දැන් සාමාන
ලෙස වළක්වා ගත හැකි ය.

ඔබගේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මගින් නොමි-
ළයේ කරනු ලබන ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා ගත්
විට මේ මාරක ළමා රෝගයන්ට ඔබට හෝ ඔබේ
ළමයින්ට අනතුරු පැමිණිවිය නොහැකි ය. එය
ලබා නො ගත හොත් රෝගය ඔබේ ගෙදරට ද
පැමිණෙනු ඇත. ඒ ගැන කිසිම අඩමානයක් නැත.

කක්කල් කැස්ස

මෙය ළමයින්ට වැළඳෙන බරපතල රෝගයකි
වයස 5 ව අඩු ළමයින් බොහෝ සෙයින් මේ
රෝගයට ගොදුරු වීමට ඉඩ ඇත. වැඩිහිටි අයට
වඩා දුරුවන්ට හා බාල ළමුන්ට මේ රෝගය
වැළඳේ.

රෝග ලක්ෂණ

කක්කල් කැස්ස ද පටන් ගන්නේ සාමාන්‍ය
හෙම්බිරිස්සාවක දී මෙන් නාසයෙන් හා ඇස්වලින්
සොටු සහ කඳුළු ගැලීමෙනි. ඉන් පසුව තරමක්
වේදනා දෙන වියළි කැස්ස හට ගනී. බොහෝ
වේලා වක් පවතින මෙම කැස්ස පළමු වෙන්
වරින් වර ඇති වුව ද, පසු වන විට නිතර නිතර
ඇති වීමට පටන් ගනී. ඇතැම් අවස්ථාවල දී
කසින විට ළමයාට හුස්ම ගැනීමට පවා අපහසු
වේ. දිගටම පැවති කැස්ස නැවතෙනවාත් සමඟ
ම ගනු ලබන හුස්ම වාර තදින් කෙරෙන බැවින්
ශබ්දයක් හට ගනී. කැස්ස ඇති වූ විට රෝගියා
ගේ මුහුණ රතු වීමත් ඇස් රතු වී කඳුළු ගැල්මක්
සිදු වේ. කැස්ස අවසානයේ දී බොහෝ විට
වමනය ඇති වේ. කැස්සේ ඇදුම සති 4 සිට 6
දක්වා පවතී.

රෝගය පැතිර යාම

කක්කල් කැස්ස විෂ බීජය රෝගීන් ගේ
නාසයෙන් හා උගුරෙන් පිට වන සෙම සොටු
සමඟ පවතී. රෝගය වැළඳුන තැනැත්තකු ඇසුරු
කිරීම නිසා අන් අයට ද බෝ වන බැවින් නිරෝගී
ළමයින්, කැස්සෙන් පෙළෙන ළමයින් කෙරෙන්
ඇත් කර තැබිය යුතු ය. එසේ ම රෝගීන් ගේ
මළ, මුත්‍ර හා සෙම් සොටු වලින් අළුතින් ම අප
චිත්‍ර වූ ද්‍රව්‍ය මගින් ද රෝගය බෝ වන බැවින්
ඒවා කෙරෙන් ද ළමයින් ඇත් කළ යුතු ය.

ආරක්ෂාව

ආරක්ෂක බෙහෙත් ශරීරයට විදීමෙන්
ඔබේ ළමයා ආරක්ෂා කළ හැකි ය. මෙම
එන්නත කක්කල් කැස්ස සඳහා පමණක් හෝ
කක්කල් කැස්ස ගලපටලය හා පිටගැස්ම යන
රෝග තුනම එකවර වැලැක්වීම සඳහා ත්‍රිත්ව
එන්නතක් ලෙස ද ගත හැකි ය.

ගලපටලය

ගලපටලය ඔබේ දේදරුවාට බෝ නොවිය යුතුම රෝගයකි. එහෙත් ප්‍රතිශක්තිකරණය මගින් ආරක්ෂාකර තැත්නම් එය ඔහුට වැළඳීමට පුළුවන. ලංකාවේ මේ රෝගය නිසා ළමයින් බොහෝ දෙනෙක් අවුරුදු පතා මිය යති.

රෝග ලක්ෂණ

ගලපටලය බෝ වන රෝගයකි. එය පැතිර යන්නේ විෂ බීජ මගිනි. සාමාන්‍යයෙන් රෝගය ඇති වන්නේ උගුරේ ය. උගුරේ මතු පිට පටක වලට රෝගය සංක්‍රමණය වීම නිසා ඒවා කළු මිශ්‍ර සුදු පාට හෝ කහ පාට වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සමඟ ම උගුර වණ වීම ද ඇති වේ. පටක ඉදිමීම හේතු කොට ගෙන ආශ්ව.ස ප්‍රාශ්වාස මාර්ග ඇසිරීම නිසා හුස්ම ගැනීම වළකී. මේ විෂ බීජ මගින් හෘදය, ස්නායු සහ වකුගඩු වලට හානි කර වූ විෂ වර්ගයක් නිපදවනු ලබන බැවින්, එම ඉන්ද්‍රියයන්ට අනතුරු පැමිණීම නිසා මරණය සිදු වීමට ද පුළුවන.

රෝග පැතිර යාම

රෝගය වැළඳුන තැනැත්තාගේ නාසයෙන් හා උගුරෙන් පිට වන සෙම් සොටු නිසා ගලපටලය පැතිර යයි. පවුලේ අසල්වාසීන් අතර හා පාසලේ සිසුන් අතර සිටින ආරක්ෂා රහිත ගලපටල වාහකයන් නිසා ද රෝගය පැතිර යාමට ඉඩ තිබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම රෝගයට දේදරුවෝ හා කුඩා ළමෝ ගොදුරු වෙති.

ආරක්ෂාව

ගලපටලය රෝගයෙන් වැළකිය හැක්කේ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ මාර්ගයෙනි. ඔබේ ළමයාට මේ එන්නතෙන් පළමු වේල මාස දෙකේ දීත්, දෙවැනි වේල ඉන් මාසයකින් පසුවත් තෙවැනි වේල තවත් මසකට පසුවත් දිය යුතු ය. ඔබට මේ කටයුතු සියල්ලම ළඟම පිහිටි සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානය මගින් කරවා ගත හැකි ය.

පිටගැස්ම

පිටගැස්ම යන නාමය පවා බොහෝ මව් පියන් බිය වද්දන සුළු එකක් බැවින්, දැන් මෙම රෝගයට නොවරදින ආරක්ෂක ක්‍රමයක් තිබීම ගැන ඔවුහු කෘතඥ වෙති. එහෙත් පුද්ගලයාට කාරණය නම් වැඩ වරද්ද ගන්නා තුරුම ආරක්ෂක බෙහෙත් ගැනීම පැහැර හරින දෙමව්පියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටීම යි.

රෝග ලක්ෂණ

පිටගැස්ම ව්‍යාධි, එක්තරා විශේෂ විෂ බීජයකින් පිට කරන විෂ හේතු කොට ස්නායු පද්ධතියේ ඇති වන නියුරු වේදනා සහිත ප්‍රකෝ-

පයකි. මේ විෂ බීජ ශරීරයේ තුවාල වූ තැනක වැඩෙමින් එතැනින් ම ශරීර ගත වෙති. ශරීර ගත වූ මේ විෂ බීජ වලින් නිකුත් කරන විෂ, රුධිර නාල මගින් මොළය ඇතුළු ස්නායු පද්ධතිය කරා යෑමෙන් අතිශය වේදනා ඇති වන පේ සිවු හැකිලීම හා තදවීම ද ඇති කරයි.

රෝගය පැතිර යාම

ගව, අශ්ව, කුකුළු හා වෙනත් සතුන්ගේ බඩවැල් තුළ තිබිය හැකි පිටගැස්ම විෂ බීජ ඔවුන්ගේ මළ සමඟ පිට වේ. විෂ බීජ සංක්‍රමණය වීමත්, ශරීර ගත වීමත් සිදු වන්නේ විෂ බීජ මිශ්‍ර පස් තුවාල වලට වැටෙන්නට ඉඩ හැරීමෙනි. වැඩි ප්‍රවේසමක් නැතිව දූව පැන සෙල්ලම් කරන ළමයින්ට වැඩියෙන් ම මේ රෝගය බෝ වීමට ඉඩ තිබේ.

ආරක්ෂාව

මේ රෝගය වැලැක්වීම සුදුසුම ක්‍රමය නම් නවීන ප්‍රතිශක්තිකරණය යි. නොහොත් ආරක්ෂා බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම යි. එහෙයින් රෝගය වැළඳීමට ඉඩ ඇති සියළු දෙනාම ආරක්ෂක බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම ඉතා අවශ්‍ය ය. දේදරුවන් හා කුඩා ළමුන්ට විශේෂයෙන් ම මේ ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු ය. කක්කල් කැස්ස හෝ ගලපටලය හෝ ඒ දෙකමත් වළක්වන බෙහෙත් සමඟ ම පිටගැස්ම ආරක්ෂා බෙහෙත ද එන්නත් කිරීම වඩාත් ම සුදුසු ය.

තුන්වරක් බෙහෙත් විදීමෙන් පමණක් දැන් රෝග තුනක්ම වැලැක්විය හැකි ය

මුලින් කියවන ලද කරුණු වලින් එක් එක් රෝගය වැලැක්වීමට හැකි එන්නතක් ද රෝග තුනම එකවර වැලැක්විය හැකි ඒකාබද්ධ එන්නතක් ද තිබෙන බව ඔබට පෙනී යන්නට ඇත. එයින් වේදනාව අඩු වේ. නැවත නැවත බෙහෙත් විදීමට පැමිණීම වළකී. ඒ සැමට ම වඩා එයින් මාරක රෝග තුනක් ම වළක්වාලයි.

ඔබේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වරයා මහජන සෞඛ්‍ය සාත්තු සේවිකාව, හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයා හමු වී ප්‍රතිශක්තිකරණය කෙරෙන ස්ථානය හා දිනය දැන ගෙන ප්‍රමාද නොවී ඔබේ ළමයා ආරක්ෂා කර ගන්න.

(සෞඛ්‍යය දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන අංශයේ අනුග්‍රහයෙනි.)