

# ගෙවත්ත

ඉතා යෝග්‍ය වේ. පැල සිටුවීමෙන් පසුව හොඳින් ජලය සපයන්න. මුල් අවධියේ දිනකට වරක් හෝ දෙවරක් දේශගුණ තත්වය අනුව ජලය සැපයීම ඉතා වැදගත්ය.

**ආවරණය:**

පොලිතින් බඳුන්වල සිටුවන ලද කෝපි පැල තද තිරු එළියෙන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සඳහා අඩි 10 පමණ උස් පියස්සක් තනා ඒ මත පැලලී හෝ පොල්අතු සෙවිලි කරන්න.

**පැල තවන නඩත්තු කිරීම:**

කෝපි පැල කුඩා අවධියේ හොඳින් ජලය සැපයීමත් හිරුඑළිය මද වශයෙන් ලබාදීමත් අවශ්‍ය වේ. පැල මෝරන අවස්ථාව එළඹීමට ක්‍රමයෙන් ජලය සැපයීම අඩුකොට දින 2 ට වරක් පමණ ජලය දැමීම සෑහේ. සෙවන ද ක්‍රමයෙන් අඩු කරන්න. පැල සිටුවීමට හෝ අලෙවි කිරීමට අදහස් කරන දිනට මසකට පමණ කලින් පෙවන සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කොට පැල හොඳින් ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ඇතිවන සේ පුහුණු කිරීම් ඉතා වැදගත් කොට සැලකිය යුතුයි. බොහෝ තවන්වල කෝපි පැල කහ පැහැති වීම නිතර දක්නට ලැබෙන්නකි. මෙය ඇති වන්නේ හිරු එළිය තදින් වැටීමෙන් හෝ නයිට්‍රජන් උෂ්ණත්වය නිසාය. යුරියා අඩුත්ස 1 ක් වතුර ගැලොම් 2 ක මිශ්‍රකර ඉසීමෙන් පැල නැවතත් යථා තත්වයට පත් වේ.

**රෝග හා පලිබෝධකයෝ:**

දිලීර රෝග හා සුළු වශයෙන් කොළ කෘත දළඹුවන් ආදීන්ගෙන් ද පැල තවන්වලට තරමක් හානි සිදු වේ.

තම අඩංගු දිලීර නාශකය ඉසීමෙන් මල කඩ රෝගය වැනි දිලීර රෝග මර්ධනය කළ හැකිය.

## කරාඬු

කරාඬු තවන් ඇරඹීම සඳහා අවශ්‍ය බීජ ලබා ගැනීමට සුදුසු තත්වයේ මව් ගස් තෝරා ගත යුතුය. නොකඩවා වර්ෂ කීපයක් අධික පලදාවක් ලබා දෙන වඩා උස් නොවූ මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ තදකොළ පැහැති කොලදාවක් තිබෙන නිරෝගී ගස් මව් ගස් වශයෙන් වෙන්කර ගත යුතුය. මල් පිපීමෙන් පසුව ඒවා කඩා ගැනීමේ දී පෙර සඳහන් කළ ආකාරයේ තෝරාගත් මව් ගස්වල තවන් කිරීමට අවශ්‍ය බීජවලට සෑහෙන ප්‍රමාණයට මල් ඉතිරි කර ගත යුතුය. මෙසේ ඉතිරිකර ගත් මල් වලින් හටගන්නා බීජ තවන් කිරීම සඳහා ගත යුත්තේ හොඳින් ඉඳුනු පසු බිම වැටෙන ඒවා පමණය.

පැල කිරීමට ගන්නා කරාඬු බීජවල පහත සඳහන් ලක්‍ෂණයන් තිබීම ඉතා වැදගත් කොට සැලකේ:—

1. රත් පැහැති නොවූ කොළ පැහැයට හුරු අම්පාට ගෙඩි වීම.



පැල තවනක්

2. රාත්තලකට බීජ 500 කට වඩා අඩුව තිබීම.
3. කෘතී භාතියකින් තොරව තිබීම.
4. ගෙඩියේ එක බීජයක් පමණක් තිබීම.

**බීජ පිළියෙල කර ගැනීම:**

ඉහත සඳහන් ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් බීජ තෝරා ගැනීමෙන් පසුව දින 3 ක් පමණ ජලයේ බහා තැබීමෙන් පිටපොත්ත පහසුවෙන් ගැලවී යයි. ඉන් පසුව සිටුවීම සඳහා සම්පූර්ණ වූ හොඳ බීජ පමණක් වෙන්කර ගත යුතුය.

**තවාන් කිරීම:**

ඉතාමත්ම පහසු ක්‍රමය වන්නේ "8 X 10" ශේඡ් 300 පොලිතින් බඳුන්වල ඇට තවාන් කිරීමයි. පොලිතින් බඳුන් පිරවීම සඳහා කැලෑ පස් හෝ ගෙවතු පස් 1/3 කොටසක් ද, ගංගා වැලි 1/3 කොටසක් ද, කොම්පෝස්ට් හෝ හොඳින් දිරා ගොම පෝර 1/3 කොටසක් ද මිශ්‍රකොට පස් මිශ්‍රණය පිළියෙලකර ගත යුතුය. මෙම මිශ්‍රණ-

යෙන් පිරවූ පොලිතින් බඳුනකට එක බීජය බැගින් අඟල් 1/2 ක් පමණ ගැඹුරින් සිටුවන්න. පොලි තීන් බඳුන් වල වැඩි ජලය වැස්සීම සඳහා සිඳුරු කීපයක් ඇති කිරීම ඉතාමත් අවශ්‍ය වේ. බීජ සිටුවන ලද පොලිතින් මලු ලං ලං ව තබා මද වශයෙන් සෙවන කරන්න. මාස 2 දී බීජ ප්‍රරෝ හනය වේ.

**තවාන් පාලනය:**

මෙසේ මාස 6ක් පමණ සෙවනේ තබා පැල හොඳින් වැඩුණු පසු එම පැල සඳහා සපයා ඇති සෙවනත් ක්‍රමයෙන් අඩුකොට ජලය සැපයීමත් අඩුකළ විට පැල හිරු එළියට ඔරොත්තු දෙන ශක්තියක් ඇති වේ. මෙසේ තවාන් කල පැල මාස 8 සිට 12 දක්වා තවානේ තබාගත හැක. කරාඬු පැල මුල් අවධියේ වැඩිම සිදුවන්නේ ඉතා සෙමින් බැවින් මයකට වරක් හෝ දෙවරක් නඹිටුපත් අඩංගු යූරියා පොහොර අවුන්සයක් වතුර ගැලොම් 2 මිශ්‍රකර ඉසීමෙන් නිරෝගි ශක්තිමත් පැල ඇති කර ගැනීමට හැකි වේ.

(ගොවිකම් සභරාව ඇසුරිණි)