

කෙසෙල් වර්ග හා

එයට වැලඳෙන රෝග

කෙසෙල්

මියුසා පැරඩයිසිකා (Musa Paradisica) යන උද්භිද විද්‍යාත්මක නමින් හැඳින්වෙන කෙසෙල් අකෂයීය පඳුරකි, මෙහි ක්‍රමයට පටන්ගත් ඇත. කඳ දක්නට ලැබෙන්නේ පොළොව අභ්‍යන්තරයේය. භූගත කඳකි. එය මෙරෙසෝම යයි ව්‍යවහාරයට එයා පැමිණි. එය නිර්මාණය වී ඇත්තේ පත්‍ර පාද එකතු වීමෙන් කෙසෙල් එලය බැරියකි. එය බීජ රහිතය. සංවෘතයෙන් තොරව එල හටගනී. එබැවින් මෙය භාකරෝත් එලනයයි. පුෂ්ප පිපින්නේ එක් වතාවක් පමණි.

පස

හොඳ ජල වහනයක් ඇති තෙතමනය සහිත පස සහ කළු ලෝම පසද, කෙසෙල් වගාවට ඉතා සුදුසු සාමාන්‍ය වශයෙන් විෂ ද්‍රව්‍ය උලින් තොර කවර පසක් වුවද කෙසෙල් වලට තෝරාගත හැකිය. බිම් බැවුම් සහිත නම් පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් උපයෝගී කොට පස ආරක්ෂා කළ යුතුය. එසේ නැති උවහොත් කෙසෙල් වගාව නිසරුවේ.

දේශගුණය

කෙසෙල් නිවර්තන කලාපීය බෝගයකි. එබැවින් සිසිල් දේශගුණය එතරම් සුදුසු නොවේ. සිසිල් දේශගුණයකදී පැලෑටි වර්ධනය උපන් වර්ධනය සිදු නොවේ. පත්‍ර සවිල්පයක් පමණක් හටගනී. එබැවින් එල හටගැනීම ප්‍රමාදවේ.

කෙසෙල් වර්ග

1. බිම් කෙසෙල්

ව්‍යව කඳ කුඩාය. පත්‍ර ලා කොළ පාටය. මෙම කෙසෙල් වර්ගය අධික සුලං හමන ප්‍රදේශ වලට යෝග්‍ය වර්ගයකි. ඉදිමුඟ ගෙඩි තරමක් රසවත්ය. එහෙත් කුඩාය. බෝ කිරීම අපහසුය.

2. ඇඹුල් කෙසෙල්

මෙම වර්ගය වගා කිරීම පහසුය සිසුරෝන් වර්ධනය වේ. ගස් ශක්තිමත්ය. උසය, පත්‍ර විශාලය කොළ පාටය. පොළොවට කඳින් කන්කු මුල් වලින් බැඳී සිටී. ගෙඩි ඉදිමුඟ කල තරමක් ඇඹුල් රසක් ඇත. වද පිදීමේ රෝගයට ඔරොත්තු දේ.

3. ඇඹුල් හොඳරවාල

මෙය තරමක් විශාල වාගයකි. මෙම වර්ගය රත්නපුර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති දේශගුණයේ හොඳින් වැඩේ. වද පිදීමේ රෝගයට ඔරොත්තු දේ.

4. අළු කෙසෙල්

ව්‍යාපන සඳහා ඉතා යෝග්‍ය වර්ගයකි. භෞමික ගුණයක් ඇත. ඉදිමුඟ ගෙඩිද ආහාර සඳහා යෝග්‍ය වේ.

5. පුවාළු

ඉතා රසවත් කෙසෙල් වර්ගයකි. එහෙත් ඇත්තරොක් නොහොත් කළුකුඩ නමින් හැඳින්වෙන රෝගයට මෙම කෙසෙල් වර්ගය පහසු වෙන් හොදුවේ.

කෝලිකුටු

මෙම කෙසෙල් වල ඉදිමුඟ ගෙඩි වල වැඩිපුර ඇත්තේ ගිලිකෝස් සිනිය. එම නිසා මෙම ගෙඩි ඉතා රසවත්ය. මර්ගීන්ට දීමට සුදුසුය.

ආනමාළු

ගෙඩි දිග, විශාල තැන් බිහිවන, කෙසෙල් වර්ගයකි. ගෙඩි ඉදිමුඟ විදිද කොළ පාටය. මෙලල රත්පත් කහපාට කට හැරුණු විම ගෙඩි කඩා හැලීමට පටන් ගනී.

8. රත් කෙසෙල්

රත්බලා නමින්ද හැඳින්වෙන මෙම කෙසෙල් වර්ගයට රතු පාට මෙලලක් ඇත. ඉදිමුඟ ගෙඩි එතරම් රසවත් නොවේ. තෙත මනය සහිත පසෙහි මේ කෙසෙල් වර්ගය හොඳින් වගා කළ හැකිය, එහෙත් බෝ කර ගැනීම ඉතා අපහසුය.

මරෝග

1. කඳකඩා වැටීමේ රෝගය

කෙසෙල් කඳත් කුෂාමිණියා නොහොත් විවිල් (Banana stem weevil) නැමැති කුෂාමිණියා කඳ විදීම නිසා මේ රෝගය ඇතිවේ. විවිල් කඳ කුෂාමිණියාගේ ගැහැණු සතා කෙසෙල් ගසේ ප්‍රාග් කඳ වද බිත්තර දමයි. එම බිත්තර වලින් බිහිවන කීටයෝ පළා පසු කුරුමින් එහි වසයි, කඳේ අභ්‍යන්තර සිදුරු වීම තසා එතැනින් දුර්වල වී කඳ කඩා දැමේ.

2. කෙසෙල් මුල් කුණුවීමේ රෝගය

කෙසෙල් මුල් විදින විවිල් (Root weevil) නැමැති කුරු මිණියා කළු පාටය. මෙම කුරු මිණියාගේ ගැහැණු සතා කෙසෙල් කඳේ පාදල හෝ මැරුණු කෙසෙල් කඳෙක හෝ බිත්තර දමයි. ඉන් බිහිවන කීටයෝ කෙසෙල් භූගත මෙරෙසෝමයේ කුහර ඇති කරමින් යුෂ් උරා බෝකි, පුස් වර්ග හා බැක්ටීරියා වර්ගද, බෙසෙල් පැලෑටියට ඇතුළුවී මෙරෙසෝමය කුණුවීම සිදු කරයි.