

පහසු සෝයා වගාවට

උපදෙස්

(රංජිත් මුල්ලේයාට විසිනි)

සෝයා වගා කාලය ඔක්තෝබරයේ ආරම්භ වෙයි. “පරණ පුරුදුකාරයෙකු” වශයෙන් කිසියම් උපදෙසක් දීම මේ වසරේ සෝයා වගා කරන්නට පුළුල් පුළුල් බලා සිටින ඔබ සැමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනි යි සිතමි.

සෝයා ඉතාම පහසුවෙන් වගා කළ හැකි බෝගයෙකි. එහෙත් සමහර විට කරමක් “ප්‍රශ්න කාරී” විය හැකිය. විශේෂයෙන්, පැළවෙන අවස්ථාවෙන් ඉන් විකකට පසුවත්ය. මේ රටේ සෝයා වගාවේදී මතුවන ප්‍රශ්න මෙසේය.

නුසුදුසු බීජ

ළඟ පහත පිහිටි සිල්ලර කඩයකින් සෝයා ඇට ලබා ගත් ඔබට සමහර විට එක් කරුණක් පෙනී යන්නට ඇත. එනම් එයින් පැළවෙන්නේ ඇට කිහිපයක් පමණක් බවයි. ඒ ඇයි? උෂ්ණත්වය වැඩි එසේ නැත්නම් තෙතමනය වැඩි තත්ත්වයන් යටතේ ගබඩා කොට තබනොත් කවිපි, මුංඇට, කඩල ආදිය මෙන් නොව සෝයා බෝංචිවල පැළවීමේ හැකියාව අඩුවෙයි. එවැනි අහිත කර තත්ත්වයන් යටතේ සති කිහිපයක් වුවද ගබඩා කොට තැබුවහොත් බොහෝ සෝයා වර්ග වල පැළවීමේ හැකියාව හීනවෙයි. සර්ව කලාපිත තත්ත්වයන් යටතේ හය මාසයක් පමණ පැළවීමේ හැකියාව රැක සිටිය හැක්කේ “නුවරඑළිය” දේශීය වර්ගයේ පොඩි බීජ වලට පමණක් බව පෙනේ. එබැවින් වගා කිරීම සඳහා වූ සෝයා ඇට අඩු උෂ්ණත්වයකින් හා තෙතමනයකින් යුත් තත්ත්වයන් යටතේ ගබඩා කර තැබිය යුතුය. සිසිල් කාමරයක නම් වඩා හොඳය. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සුදුසු පිළිවෙලකට සෝයා බීජ ගබඩා කරයි. බීජ ලබා ගන්නට අදහස් කරන උදවිය එතැනින් ලබා ගත යුතුය.

පැළවීම සඳහා සෝයා බෝංචි වලට, කවිපි හෝ මුංඇට ආදියට වඩා පසේ තෙතමනයක් අවශ්‍යය. එම නිසා තරමක තෙතමනයක්ද ඇති බිමක සෝයා වගා කළ යුතුය.

සෝයා පැළවී බොහෝ විට පොලෝ මට්ටමින් මතු නොවන්නේ ඕනෑවට වඩා ගැඹුරින් බීජ සිටුවීම නිසාය. හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබීමට නම් අහලේ සිට අහල් එකහමාර දක්වා යටට සිටුවිය යුතුය. නියම තත්ත්වයන් යටතේ සිටුවූ දින තුන හතරකින් පැළ මතුවනු ඇත.

පස ඇලෙන ගතියක් දක්වන වඩාත් තෙත් කාලගුණයක සෝයා නොසිටුවිය යුතුය. ඊළඟට එළඹෙන වියළි කාල ගුණයේදී පස වේළි සහ තට්ටුවක් වශයෙන් සිටිය හැකි බැවිනි. එබඳු තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් පැළයට මතුවීම අසීරු විය හැකිය.

හාවන් සහ ගිරවුන්

පැළ ජේළියට හිස් තැන් තිබීමත් පැළ අතර සම දුර ප්‍රමාණයක් නොතිබීමත් නිසා ඇති වන්නේ අක්‍රමවත් භාවයකි. මේ අක්‍රමවත්භාවය අස්වැන්න අඩුවීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙයි. එම නිසා මුල සිටම වගා ජේළිවල ක්‍රමවත් භාවයක් තබා ගන්නට වග බලා ගත යුතුය.

නිල කොබෙයියන්, පරෙවියන්, ගිරවුන් වැනි කුරුල්ලෝ සෝයා බෝංචි කුඩා පැළවලට විශේෂයෙන් කොල හට ගැනීමට ඔන්න මෙන්න කියා කිබියදී, ලොකු කැමැත්තක් දක්වති. මෙවැනි කුරුල්ලන් බහුල පළාත්වල විශේෂයෙන් පාන්ද-

රත් සවස් වරුවෙන් ඔවුන් පළවා හරින්නට කෙනෙකු යොදවා ගැන්ම අවශ්‍ය විය හැකිය. බීජ සිවුවා තුන්වැනි දවසේ සිට දවස් තුනක් පමණ යන තුරු මෙසේ කිරීම ප්‍රයෝජනවත්ය.

සෝයා පැළවෙන අවස්ථාවේ ප්‍රධාන තර්ජනයක් භාවත්ගෙන් එල්ල විය හැකිය. ඔවුන් සෝයා බෝංචි වගා බිම් වලට පැමිණ හානි සිදු කරනුයේ එක්කෝ සවස 7 ට පමණය. එසේ නැත්නම් පාන්දර 4 ට 5 ට පමණය. වතුර ගැලුම් තුනකට පැරතියොන් දියර අවුත්සය බැගින් කලවම් කොට වගාව පුරා ගැසීමෙන් භාවත් විනාශ කළ හැකි බව ඔප්පු වී තිබේ.

සුදුසු පරිදි බිම් සකස් නොකිරීම නිසාද අක්‍රමවත්භාවය ඇති වෙයි. බීජ එක ක්‍රමයකට පැළවීමට නම් බිම් මනාසේ සකස් කොට ගත යුතුය. හැම තැනම එක මට්ටමකට තිබීමත් වළවල්, පහත් තැන් ආදියෙන් තොරවීමත් අත්‍යාවශ්‍යය. වළවල් ආදිය ඇති තැන මෝසම් වැසි වතුර රඳා පවතිනු ඇත. වතුර හිරවී තිබීම බීජ පැළවීමට බාධාවෙකි. අත්තිමේදී පේළිවල අක්‍රමවත් භාවයක් හට ගනී.

මේ ලිපියේ දක්වා ඇති උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් සෝයා වගාව ලෙහෙසි වූත් පලදායී වූත් වගාවක් බව ඔබට දැනගන්නට ලැබෙනු සිතුවෙයි.

(සෝයා පුවත් අනුග්‍රහයෙනි)