

හාචුන් ඇති කිරීම



දියුණු වන රටවල් වල මස් සඳහා හාචුන් ඇති කිරීම වැදගත් ස්ථානයක් ගෙන ඇත. මෙයට හේතු වන්නේ :

(අ) ඔටුන් සඳහා සපයන ආහාර සඳහා කර්මයක් නොතිබීම.

(ආ) අටු වියදමකින් හා අටු කාලයකින් මස් ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

(ඇ) ඔටුන් සඳහා දරන්නට ඇති මූලික වියදම් වන කුටු සඳහා යන වියදම් අටුවීම යන ඒවාය.

හාචුන් ඉතා සිසුයෙන් බෝ වන සතුන් වර්ගයකි හාචුන්ට සාපේක්ෂ වශයෙන් කෙටි ගැබ් කාලයක් තිබීමත්, මුළුබරට අනුපාතිකව දිනපතා බර එකතු වීම වැඩි වීමත්, කෙටි කාලයක දී අභිජනනයට සුදුසු වීමත් යන කරුණු මත හාචුන් ඉක්මණින් බෝ කර ගත හැකිය. එක ගැහැණු සතෙකුට වර්ෂයක් තුල පැටවුන් 32 ක් පමණ බිහි කළ හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ හාචුන් ඇති කිරීම එතරම් ජනප්‍රිය නොවුවත් ගවමස් එළු මස් උතුරු මස් හා සත්සන්දනය කරන විට පෝෂ්‍ය ගුණය අතින් හා මස් ඉතා සතුටුදායක බව පෙනේ. මෙය පහත දැක්වෙන සටහනින් පැහැදිලි වේ.

	මාංශ ජනක බ.ත(%)	මේද (%)	ලවණ (%)
හා මස්	20,5	4	1.5
ගව මස්	18.5	18	0.9
එළු මස්	17.0	25	1.0
උතුරු මස්	16.0	27	1.0

හා මස් වල වැඩිමාංශ ජනක බැවින් උවන ප්‍රමාණයක්ද, අටු මේද ප්‍රමාණයක්ද ඇති නිසා මිනිස් පෝෂණයට හිතකර බව පැහැදිලිය.

හාචුන් වර්ග

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කිරීමට යෝග්‍ය වන්නේ මධ්‍යම තරමේ සුදුපැහැති කෙටි ලෝම ඇති හාචුන් ය. ඒ සඳහා සුදුසු වන්නේ නවසීලන්ත සුදු හාචුන් වර්ගය හා කැලිපෝර්නියා හාවන් ය. තවත් ජනප්‍රිය වී ඇති හාචුන් වර්ග නම් :

1. නිමාලයා වර්ගය
2. යෝද ස්ලෙට්ස් වර්ගය
3. බෙවරෙන්
4. චින්ටිලා
5. ඩව්
6. ප්‍රංශ ලොස්
7. රෙක්ස්

හාචුන් සඳහා කුඩු සෑදීම

සාමාන්‍යයෙන් හාචුන්ට තරමක් සිසිල් ස්ථාන වඩා යෝග්‍ය වේ. උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම ප්‍රජනනය කෙරෙහි බලපාන බැවින් කුඩු තැනීමේ දී මෙය සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණකි. එමනිසා කුඩු ගංගා හා පොකුණු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල හෝ මඩු තුල හෝ සෙවන ඇති ස්ථානයන්හි තිබිය යුතු ය.

කුඩු තැනීමේ දී පුවක්, උණ බටයුලි වර්ග හෝ කම්බි භාවිතා කළ හැක. හාචුන් සඳහා කුඩු තැනීම අටු වියදමකින් කර ගත හැක.

පිරිමි හාචුන් තනි තනියට ඇති කල යුතුය. ගැහැණු සතුන් ඒදහා තනි කුඩු අවශ්‍ය වන්නේ පැටවු ඇති කිරීම සඳහාය.

හාචුන් බෝකිරීම

බෝ කිරීම සඳහා තෝරා ගන්නා හාචුන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් සිටිය යුතු අතර හොඳට වැඩුණු පුෂ්ටි මත් සතුන් විය යුතුය. එම සතාගේ දෙමව්පියන්ගේ ලක්ෂණ (පරම්පරාවෙන් රැගෙන එන) හොඳ විය යුතුය.

මීට අමතරව සලකා බැලිය යුතු කරුණු නම් ඉතා හීලෑ බව, එක මුරයකට වැඩි පැටවුන් සංඛ්‍යාවක් ලැබීම, කිරෙන් වැරීමේ දී වැඩි බරක් තිබීම, පැටවුන් හොඳහැටි රැක බලා ගැනීමේ හැකියාව හා පැටවුන් උත්පත්තියේ දී මරණ සංඛ්‍යාව අඩු වීමයි.

මස් සඳහා ඇති කරන ක්ෂීරපායී සතුන් අතරින් වඩාත්ම අධික ප්‍රජනන වේගයක් තිබෙන්නේ භාවාටය භාවුන් ඇති කිරීම දියුණු කළ හැකි එකම මග ඔවුන් බෝ කිරීමේ ක්‍රමයයි. මෙහිදී සැලකිල්ලට ගතයුතු කරුණක් වන්නේ ලඟ නැදැකම් ඇති භාවුන් අතර මුහුන් කිරීම (පට්ටි දැමීම) වැළැක්වීමය. මේ අයුරින් ලැබෙන පැටවුන් ඉතා හොඳ ලක්ෂණ පෙන්වුම් නොකරති. එමනිසා එක් පරම්පරාවකින් තෝරා ගන්නා ගැහැණු භාවුන් පට්ටි දැමීම සඳහා උන්ට නැකම් නැති පිරිමි භාවුන් තෝරා ගත යුතුය.

තවද මස් සඳහා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩෙන පැටවුන් ලබා ගැනීම සඳහා එකිනෙකට වෙනස් හා වර්ග දෙකක් පට්ටි දැමිය යුතුය.

උද : යෝද ජලේච්ඡ (පිරිමි)—නවසිලන්ත සුදු

(ගැහැනු)—ශීඝ්‍රයෙන් වැඩෙන දෙමහුන් පැටවු එහෙත් මේ දෙමහුන් පැටවු බෝ කිරීම සඳහා පාවිච්චි නොකරන්න.

ආහාර

භාවුන්ට ආහාර සඳහා වන වියදම ඉතාමත් අඩු වන අතර මිනිසුන්ගේ ආහාර සමග තරග නොකරයි සාමාන්‍යයෙන් භාවුන්ගේ ආහාර සඳහා යෝග්‍ය වන්නේ තණ කොළ, උදුපියලිය, ඉපිල් ඉපිල්කොළ බතල කැරට් එරබදු, පලා වර්ග හා පුත්තකු යනාදියයි. සෑම විටම ලවණ මිශ්‍රණයක් දීම ඉතා වැදගත් ය.

සාමාන්‍යයෙන් තණකොළ (නොමේරූ මල් පිපීමට පෙර) දිනකට කි. 1-1½ ක් සැපයිය යුතුය. නිතර පිරිසිදු ජලය බීමට තිබිය යුතුය. ගැහැණු සාවකු සහ පැටවුන් සඳහා දිනකට ජලය ගැලුම් 1-2ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. ජලය තැබීම සඳහා ටින්, බෝතල් හෝ ඇතිලි පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන.

පාලනය

සාමාන්‍යයෙන් ගැහැණු සාවුන් මාස 5-6 ක් පමණ වයසට පැමිණි විට පට්ටි දැමීමට සුදුසු කාලය වේ. එවිට සාමාන්‍යයෙන් බර කි. 3 ක් පමණ වේ. අනිකුත් සතුන් මෙන් ගැහැණු සාවුන් පට්ටි ලකුණු

නොපෙන්වයි. ගැහැණු සාවුන් 10 දෙනෙක් සඳහා එක පිරිමි භාවකු සෑහේ. දැමීම සඳහා ගැහැණු භාවා සහ පිරිමි භාවා එක් කළුවක එක් දිනක් තබා ඉන් ඉන්පසු ව වෙන් කළ යුතුය.

භාවුන්ගේ ගැබ කාලය දින 30 ක් පමණ වේ. ප්‍රසූතියට දින කීපයකට පෙර ගැහැණු භාවා ඇගේ ලෝම ගලවනු දැකිය හැකිය. එවිට ඇයට උණුසුම් පිරිසිදු පහසු ස්ථානයක් පැටවුන් දැමීම සඳහා සැපයුව හොත් වඩාත් මැනවි. පැටවු දැමූ විගසම මැරී ඇති, දුර්වල හෝ විකෘති වූ පැටවුන් වහාම ඉවත් කළ යුතුය. ප්‍රසූතියෙන් පසු මවට ලා තණකොළ හා පුත්තකු ස්වල්පයක් සැපයිය යුතුයි. මවගෙන් පැටවා වෙන් කරන්නේ දින තිස්අටක් ගත වූ විටය. දින 10 ක් වයස් වූ විට පැටවුන් ඇස් ඇරී ප්‍රසූතියෙන් දින 2 ක් හෝ 3 කට පසුව නැවතත් පට්ටි දැමීමට පුළුවන. එසේ නැතහොත් පැටවුන් මවගෙන් වෙන් කළ වහාම පට්ටි දැමිය යුතුය.

මස් සඳහා විකිණීම

සාමාන්‍යයෙන් භාවකු කි. 2 ක් පමණ බරට පැමිණි විට මස් සඳහා සුදුසු වේ. ලංකාවේ මෙම බර ලබා ගැනීමට මාස 4 හෝ 5 ක් පමණ ගත වේ.

රෝග

ගබ්සාව සහ පැටව් උපතේ දී මැරී යීම—

මෙය රෝග නිසා හෝ ගැබ්බර භාවා කලබල කිරීමෙන් හෝ සිදු විය හැකිය.

පැටවුන් මිය යාම

පළමු සතිය තුළ පැටවුන් මිය යන්නේ පහත සඳහන් කරුණු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. අධික සීතල දුර්වල පැටවු ඇති බව, පැටවු කිරි නොබීම, මවට කිරි නොමැති කම, වැඩි පැටවු ගණනක් ඇතිකම, තන ඉදිමීම.

කොක්සිඩියෝසිස්

කොක්සිඩියෝසිස් රෝග ලක්ෂණ එකට රොක්වී සිටීම, හම ගොරෝසු වීම හා සමහර විට බඩයෑම වේ.

අනෙක් රෝග

බඩ යෑම, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හා නියුමෝනියාව යන රෝග වලට භාවන් ඉතා පහසුවෙන් ගොදුරු වේ. භාවන් අසනීප වූ විට වහාම පඳු වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත යුතුය. අසනීප වූ භාවකු පඳු වෛද්‍ය නිලධාරියාට පෙන්වා ප්‍රතිකාර ලබා දිය යුතුය.

කල්තබා ගත හැකි ගව ආහාරයක්

වියළි කාලවල ලබාගත හැකි තණකොළ ප්‍රමාණය අඩු බැවින් ඔබගේ එළඳෙනට ආහාර සැපයීම අපහසු විය හැක. එහෙත් වර්ෂා කාලයේ ප්‍රමාණයටත් වඩා තෘණ අස්වැන්න වැඩිවන බව ඔබ දන්නා කරුණකි. මෙම වර්ෂා කාලයේ නිපදවෙන අමතර තෘණ අස්වැන්න, තෘණ කල් තබාගන්නා ක්‍රමයක් වන සයිලේජ්, බවට හරවා ඒවා වියළි කාලයේදී ප්‍රයෝජනයට ගත හැක. එවිට වියළි කාලයේදී තෘණ හිඟයක් ඇතිවීම ඔබට ප්‍රශ්නයක් නොවනු ඇත.

සයිලේජ් සෑදීම

සයිලේජ් යනු—අළුතින් කපාගත් තෘණ වායුප්‍රෝදක තත්ව යටතේ ගබඩා කර තැබූ විට ලැබෙන අවසාන ඵලය වේ. සයිලේජ් සාදා ගන්නා ස්ථානය “සයිලේජ්” නම් වේ.

යොදාගත හැකි ද්‍රව්‍ය

- * තණකොළ—ඕනෑම වර්ගයක්
- * ධාන්‍ය—සෝගම්, තිරිඟු
- * රණල—ගිරිසිඬියා, ඉපිල් ඉපිල්, (තණකොළ සමඟ 50%ක් මිශ්‍ර කරගත හැක.)
- * අමතර ද්‍රව්‍ය—උක්ගස් කරවි, බතල වැල්, ඉවත ලන පළතුරු හා එලවළු කොටස්.

තත්වයෙන් උසස් සයිලේජ් සෑදීමට නම් :—

- * භාවිතා කරන තෘණ, මල් පිපීමට පෙර කපා ගන්න.
- * භාවිතා කරන තෘණවල 65% 70% ක පමණ සාමාන්‍ය තෙත් ගතියක් තිබිය යුතුය. තෙත් ගතිය වැඩිනම් වියලන්න. වියලීම වැඩිනම් ජලය විකක් ඉසින්න. නියම තත්වයට වියළි ඇත්නම් තෘණ මිටක් ගෙන මිරිකීමෙන් පසු සෙමින් දිග ඇරෙනු ඇත.

පළමුව දිග තෘණ හෝ අනෙක් කොටස් අහල් 9 පමණ කැබලි වලට කපාගන්න. කපාගත තෘණ සයිලේජ් වලට දමන්න. තෘණ තට්ටුවක් දමා හොඳින් තද කර ඉන් පසු තවත් තෘණ තට්ටුවක් දමා හොඳින් නැවත තද කරන්න. තෘණ තට්ටු අතරට ධාන්‍ය ස්වල්පයක් දමීමෙන් පෝෂ්‍ය ගුණය වැඩි සයිලේජ් සාදා ගත හැක. තෘණ තද කිරීම මුත්තර මගින් හෝ මිනිසුන් යොදවා හෝ කරගත හැක. තද කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වාතය ඉවත් කිරීමයි.

හොඳින් තදකර වල මුදුන් වන සේ පිරවීමෙන් පසු පොළිකින් එකකින් පිරුණු වල වසා, ඒ මත තුනී පස් තට්ටුවක් අතුරන්න. දින තුනකින් පමණ මට්ටම යහලු බැසී නම් නැවත පස් තට්ටුවක් යොදන්න. සයිලේජ්ව පිරවීමේදී දින එකක් හෝ දෙකක් ඇතුලත පුරවා අවසන් කරගත යුතුය.

සහනාධාර

සයිලේජ් සෑදීමට දිරි ගැන්වීමක් වශයෙන් සවන් නිෂ්පාදක හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව රු. 1,800 ක සහනාධාර මුදලක් ගව හිමියන්ට ලබාදේ. මෙම මුදල වාරික තුනකින් ගෙවනු ලැබේ.

පළමු වාරිකය රු. 800 යි.

දිග අඩි 12 පළල අඩි 6 උස අඩි 4 ප්‍රමාණයේ වළක් සකස්කල පසු පළමු වන වාරික මුදල ලබා ගත හැක.

දෙවැනි වාරිකය රු. 500 යි.

සකස්කල වලට ජලය කාන්දු වීම වැලැක්වීමට ගෘඩාල් බිත්ති බැඳීමෙන් පසු මෙම වාරිකය ලබා ගැනුමට පුළුවන.

තුන්වැනි වාරිකය රු. 500 යි.

වල තෘණ වලින් පුරවා අවසන් වූ පසු මෙම වාරිකය ලබාගැනීමට පුළුවන.