

ඔබේ ගෙවත්තේ වැටිය හැකි ලුණු වර්ගයක්

විවේක කාලයේ දී අත්හද බැලිය හැකි පහසු වගා ක්‍රම හඳුන්වා දෙන “අත්හද බැලීම්” තීරයට මෙවර එක් වන්නේ ඔබේ ගෙවත්තේ හෝ මල් පෝච්චිවල කල හැකි වැවිල්ලකි. එය රතුඑණු වලට ආදේශකයක් වන පහසු වගාවකි. ඔබත් උත්සාහ කර බලන්න.

ශ්‍රී ලංකා ජපන් ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ ජපන් ව්‍යාපාර අධිකාරි විෂේෂය සමඟ මහනා විසින් 1972 වසරේ දී පද්වනුව විශේෂ ව්‍යාපාරයට ගෙවතු වගා බෝගයක් හැටියට නිරා ලික්ස් හඳුන්වා දෙන ලදී. දැනට කොළඹ සහකාර කෘෂිකර්ම කායාර්මග්‍රමයේ ආදර්ශණ වගාවක් පිහිටුවා ඇත. මෙම වගාව ඉදිරි කන්නයේදී ගොවීන් අතර ජනප්‍රිය කිරීම සඳහා බීජ සහ පැල බෙදා දීමටත්, අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමටත් කටයුතු කර ඇත. මෙම ලික්ස් වර්ගය යොදා ආහාර සකස් කිරීම ව්‍යාජන කිරීම ගොවී කාන්තා ව්‍යාජන නිලධාරීන් විසින් ස විධානය කරනු ලැබේ.

ආරම්භය:

මෙය ජපානයේ සුදුපැහැ රතුපැහැ දෙලිහුන් කර සාදන ලද ලික්ස් විශේෂයකි. මෙය නිරා ලික්ස්, ජපන් ලික්ස්, වයිවස් යනුවෙන් නම් කිහිපයකින් හඳුන්වනු ලබයි. මෙහි උද්භිද නාමය: “ඇලියම් ස්කෙන්ට් ප්‍රයම්” ය.

වගා කිරීම: බීජ පහින් සහ පැල වලින් බෝකරනු ලැබේ. පැල වලින් බෝ කිරීමේ දී පඳුරු ගලවා අලය තුවාල නොවන පරිදි පැලවල මුල් කපාගත යුතුය. එක වලක පැලයක් හෝ පැල දෙකක් සිටවන්න. පැල ව්‍යාජනයේ දී පඳුරු ගොටු පකාල පටන් පඳුරු වලින් පැල ගලවා පෙලිකින් පලුවල සිටවා ව්‍යාජන කරගත හැකිය. තෙත් කලාපයේ සහ ජල සම්පාදනය යටතේ වියළි කලාපයේ පහදින් වැටේ.

තවත් සකස් කිරීම

පස හොදින් පරලා කැල පොඩිකර සිසුව කරගත යුතුයි. විශලි මාට් යන පොටොපෝස්ට පොහොර 2: 1 අනුපාතයට කලවමකර, සල්ලඩයකින් ගලා අහල් 4” තවටුවක් සිටින පරිදි පාත්තිය මත අතුරා තුනි කරන්න. ඉන් පසු පේලි අතර අහල් 4” ක් පරතරය සිටින පරිදි බීජ පේලියට තවත් කරන්න. නිතර තෙතපනය අවශ්‍ය බැවින්, උදේ ගවය වතුර සපයන්න. පැල මතු වන තුරු ලනු ගෝතියකින් වසා ජලය වඩාත් සැපයීම වඩාත් ප්‍රතිපලදායක වේ. පැල මතු වුවාට පසු ගෝති ඉවත්කර ජලය සැපයිය යුතුයි.

තබන්නාව

බීජ දො පැල පතු වුවාට පසු දින 14 කින් වතුර ගැ. 1 ට සුරියා මෙය හැදී 1 ක් කලවට කර වත් කරන්න. ඉන්පසු සුරියා පිඹ වතුර පසට හේදියා ලෙස නාවන වරක් වතුර යොදන්න. නිතර තෙතපනය අවශ්‍ය බැවින්, පේලි අතර පකාහුවක් අතුරන්න. දින 15 ට පසු පැල ගලවා මක්ඵ්‍රයේ සිටවිය හැක.

කේෂ්‍රයේ සිටුවීම

පස අහල් 9 පැණ ගැඹුරට පරලා පාත්තිය පුළුස්සා ගන්ටත් නො හැකවී. පස්කැට පොඩි කර පස සිසුව වනපේ සකස් කරන්න. වියලි මාට් කුඩු සහ පොටොපෝස්ට කලවු කර පාත්තිය මතුපිට අතුරා පේලි අතර අඩි 1 සහ පැල අතර අහල් 9 සිටින පරිදි පැල සිටුවන්න. පසේ පතනපනය වෙතො

බැවින් පේලි අතර පකාහු බත් අතුරා පස් බුරුල්කර සපයන්න. සති 2 කට වරක් සුරියා පිඹණය යොදන්න. නිතර පස් බුරුල් කිරීමෙන් සහ තෙතමනය ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් පැලයේ වැඩිම ඉක්මන් වේ.

අස්වැන්න නෙලීම

සිටුවා දින 45 කින් ආහාරයට ගැනීම සඳහා පොලව මට්ටමින් 3” කට ඉහලින් පිහිටිකින් කපා ගත යුතුයි. සති 2 ට වරක් කපා ගත හැකිය. වැඩිම ඉක්මන්වීම සඳහා පොහොර සහ ජලය සැපය යුතුය.

පාහාරයට ගැනීම

ලුණු සහ ලික්ස් වෙනුවට ආදේශ කළ හැකිය. ආහාර පිළියෙළ කිරීමේ පයිඩරයිස්, බිත්තර ඔමලට්, නුඩලස්, එළවළු සුප් වලට සහ අල දමා ව්‍යාජනයක් හැටියටත්, පොල් සම්බල වලට කොළ ලියා කලවට කිරීමෙනුත්, කර වල හාල් මැස්සන් තෙල් දමා ගැනීමේ දී ද ලුණු වෙනුවටත් පැවිච්චි කල හැකිය.

ඖෂධීය ගුණය

වාත රෝග වලට ගුණදායක ඖෂධයක් බව ජපන් ජාතිකයින්ගේ විශ්වාසයයි.

වාත ආහාය ඇති අයට පොල් මිටි කිරි ස්වල්පයක් පොදා නිරා ලික්ස් ව්‍යාජනයක් මෙය පිළියෙල කර ආහාරයට ගත හැකි ය.

පකාලය සහකාර කෘෂිකම් අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාජනී)

එම්. එස්. එම්. අස්මී

සහ

කෘෂිකම් උපදේශිකා (රොවතු වගා) කේ. ආර්. කේ. මෙන්ඩිස්